UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Prof. dr. Stelian FLOREA

CHIMIE ORGANICĂ

TERPENOIDE, COMPUȘI HETEROCICLICI, ALCALOIZI ȘI COLORANȚI

REPROGRAFIA UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA
1997

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE STIINTE

SECTIA DE CHIMIE

Prof.Dr.STELIAN FLOREA

C H I M I E   O R G A N I C A

(TERPENOIDE, COMPUSI HETEROCICLICI, ALCALOIZI SI COLORANTI)

— CRAIOVA 1997 —

1. COMPUSI ORGANICI NATURALI

1.1. GENERALITATI

Prin compuşi naturali înţelegem substanţele organice produse de organismele vii (microorganisme,plante, animale). Compuşii naturali sunt foarte răspândiţi şi prezintă cele mai variate structuri chimice. Datorită numărului mare şi diversităţii sructurale, nu există, până în prezent, o părere unitară în privinţa clasificării compuşilor naturali. Iată câteva sisteme de clasificare:

a) Clasificare bazată pe scheletul moleculei:

- compuşi alifatici aciclici (acizi graşi, grăsimi, ceruri, mulţi aminoacizi, zaharuri);
- compuşi alifatici ciclici (terpene şi terpenoide,steroide, unii alcaloizi);
- compuşi aromatici (fenoli, chinone);
- compuşi heterociclici (alcaloizi, flavonoide, acizi nucleici).

b) Clasificare bazată pe activitatea fiziologică :

- hormoni,
- vitamine,
- antibiotice,
- micotoxine.

c) Clasificare bazată pe grupele funcţionale:

- fenoli (polifenoli),
- acizi carboxilici.

d) Clasificare având la bază un element chimic:

- compuşi cu oxigen,
- compuşi cu azot, etc.

Se poate deduce că apar dificultăţi atunci când dorim să clasificăm un compus cu structură chimică complicată,în care coexistă nuclee izociclice, aromatice sau heterociclice pe care sunt grefate grupe funcţionale identice sau diferite.

De regulă, principalele grupe de compuşi naturali, cum sunt grăsimile, glucidele, aminoacizii, vitaminele şi hormonii sunt tratate la locul indicat prin structura lor, în cadrul clasificării sistematice a compuşilor organici, iar compuşii cu schelet poliizoprenic şi alcaloizii se tratează separat.

1. 2. PRODUSI NATURALI CU SCHELET POLIIZOPRENIC
(TERPENOIDE, IZOPRENOIDE)

Terpenoidele constituie o grupă de produşi naturali importanţi atât din punct de vedere practic cât şi teoretic. Ele se găsesc în special în regnul vegetal şi corespund formulei generale ($C_5H_8)_n$, unde „n" este cuprins, de regulă, între 2 şi 9. Se deosebesc monoterpene (n=2), sesquiterpene (n=3), diterpene (n=4), triterpene (n=6), tetraterpene (n=8). Hidrocarburile din aceste subclase se numesc generic terpene, iar derivaţii oxigenaţi se numesc terpenoide.

In regnul vegetal se întâlnesc, uneori, şi hidrocarburi macromoleculare cum sunt cauciucul natural şi gutaperca (balata) care corespund formulei generale (C_5H_8)$_n$. In 1826 a fost obţinută hidrocarbura cu formula C_5H_8 prin distilarea uscată a cauciucului natural şi a fost numită izopren. Structura izoprenului a fost determinată în 1897. Intre timp , s-a constatat formarea de izopren la trecerea uleiului de terebentină, a cărei componentă principală este o monoterpenă (α- pinenul) printr-un tub de fier încălzit la roşu. Examinându-se structura multor monoterpene, a reieşit că scheletul hidrocarbonat al acestora este format din două unităţi izoprenice legate „cap-coadă":

```
2 C - C - C = C  →  C-C-C-C-C-C-C-C
      |               |       |
      C               C       C
 izopren
```

Cercetarea structurii terpenelor superioare a arătat că şi aceşti compuşi naturali sunt constituiţi din unităţi izoprenice. Ulterior, s-a arătat că şi steroidele pot fi considerate ca poliizoprenoide. Din această cauză, Ruzicka (1921) a formulat aşa numita regulă izoprenică, o regulă care pune

la baza biosintezei terpenelor, terpenoidelor şi chiar a întregului material vegetal, molecula de izopren. Această regulă a devenit o preţioasă călăuză în lucrările pentru stabilirea structurii terpenelor superioare, terpenoidelor şi ulterior a steroidelor, dar regula izoprenică are un caracter pur formal, deoarece izoprenul nu apare ca intermediar în biosinteza terpenelor, terpenoidelor şi steroidelor. Adevăratul precursor pentru biosinteza acestor compuşi naturali este acidul mevalonic şi care la rândul lui se obţine din acetil- coenzima A, care se formează în metabolismul lipidic şi glucidic.

1.2.1. MONOTERPENE SI MONOTERPENOIDE

Hidrocarburile din această clasă au formula moleculară $C_{10}H_{16}$ şi pot fi aciclice, monociclice sau biciclice. Ele se găsesc în uleiurile eterice (volatile, esenţiale) rezultate prin distilarea cu vapori de apă a unor flori, fructe sau frunze. Alteori, uleiurile eterice se extrag din anumite părţi componente ale plantelor cu solvenţi nepolari,ca eterul de petrol sau tetraclorura de carbon. Deoarece au proprietăţi aromatizante şi odorante, aceste uleiuri sunt larg utilizate în industria parfumurilor, cosmetică, farmaceutică.

In organismul plantei, uleiurile volatile suferă o serie de transformări în funcţie de stadiul de dezvoltare şi de condiţiile pedoclimatice în care se dezvoltă planta. Astfel, în fructele de coriandru s-au identificat, în funcţie de stadiul de dezvoltare, următorii compuşi:



Aldehidă decilică (boboc) — Aldehidă decilenică (Început de înflorire) — Aldehidă izo-decilenică (Înflorire completă)



Mircen (fruct lapte) Linalool (fruct ceară) Limonen (fruct matur)

1.2.1.1. MONOTERPENE SI MONOTERPENOIDE ACICLICE

In natură au fost găsite două monoterpene aciclice: mircenul, în uleiul de hamei şi ocimenul, în cel de busuioc:



Mircen Ocimen

Structura acestor hidrocarburi a fost stabilită prin ozonoliză. Ele au fost obţinute şi din β-pinen (mircenul) şi respectiv din α-pinen (ocimenul), care la rândul lor se găsesc în uleiul de terebentină obţinut din răşina de pin prin antrenare cu vapori de apă.

Din această clasă fac parte şi alcooli şi aldehide cu o singură dublă legătură sau cu două duble legături carbon- carbon. Astfel citronelolul, una din componentele uleiului de trandafir şi de muşcată, este un alcool cu o singură legătură dublă şi apare în două structuri izomere care au fost determinate prin ozonoliză:



Structura izopropilidenică

Acetonă



Structură
izopropenilică

Tot din această subclasă fac parte şi 3 alcooli, izomeri geometrici: geraniolul, nerolul şi linaloolul, fiecare având două legături duble şi putând exista sub cele două structuri izomere.



Geraniol (izomer-trans)



Nerol (izomer cis)



Linalool

Geraniolul se găseşte în uleiul de flori de trandafir şi în cel de muşcată,nerolul în uleiul de neroli (portocal amar) iar linaloolul se găseşte sub forma izomerului levogir în uleiul de levănţică şi respectiv sub forma izomerului dextrogir în uleiul de flori de portocal şi de coriandru.

Prin oxidarea blândă a geraniolului, de exemplu prin metoda Oppenauer, se obţine citralul, o aldehidă ce se găseşte în uleiul de iarbă de lemon şi în cel de lămâie.



Citral a

Din nerol se obţine, similar, aldehida corespunzătoare, numită uneori citral b, spre deosebire de aldehida obţinută din geraniol care se numeşte citral a.

Structura monoterpenoidelor a fost determinată prin reacţii de degradare oxidativă şi prin interconvertirea principalilor reprezentanţi. Astfel s-a observat că linaloolul prin tratare cu anhidridă acetică în mediu acid formează în afară de acetat de linalool şi acetat de geraniol şi de nerol. Această izomerizare este o transpoziţie alilică tipică şi se datoreşte apariţiei intermediare a unui cation alilic:



Geraniol Linalool Nerol

Monoterpenoidele aciclice pot suferi şi reacţii de ciclizare. De exemplu, linaloolul şi nerolul la tratare cu acid sulfuric diluat formează α-terpineol:



Nerol

Linalool

α- Terpineol

Din cauza poziţiei transoide a grupării hidroximetil, geraniolul se ciclizează mai greu.

Reacţii de ciclizare în mediu acid prezintă şi citralul, dar după protejarea prealabilă a grupării aldehidice:



(β) Ciclocitrali (α)

In acest fel, după deprotejarea grupării aldehidice se obţin α- şi β- ciclocitralul.

Prin condensarea crotonică a citralului cu acetona în mediu slab bazic se obţine pseudoionona, care prin ciclizare în mediu acid conduce la α- şi β-Iononă .



β-Iononă α-Iononă

Mecanismul acestor ciclizări ale citralului, cu grupa aldehidică protejată, este următorul:



(α) (β)

Cele două Ionone au miros de toporaşi sau de micşunele, motiv pentru care se utilizează în parfumerie.

1.2.1.2. MONOTERPENE SI MONOTERPENOIDE MONOCICLICE

Conţin în moleculă scheletul de atomi de carbon al mentanului (1- metil- 4- izopropilciclohexanul).

Mentan

Cele mai răspândite terpene din această subclasă sunt limonenul şi terpinenii:



Limonen α - Terpinen β-Terpinen

Limonenul,având un centru de chiralitate, poate exista sub forma celor 2 enantiomeri şi a racemicului.Izomerul dextrogir se izolează din uleiul de coji de portocală şi de lămâi, izomerul levogir din uleiul de ace de brad şi de molid, iar racemicul se găseşte, printre altele, în uleiurile de camfor şi de iarbă de lemon.

Terpinenii se găsesc în uleiul eteric de măghiran şi de coriandru.

Structurile limonenului şi terpinenilor au fost determinate pe cale chimică. Limonenul prin hidrogenare catalitică se transformă în mentan iar prin aromatizare în *p* - cimen.



p-Cimen Limonen Mentan

Terpinenii prin adiţie de acid clorhidric uscat formează 1,4 - diclormentanul.

Poziţia celor două legături duble a fost determinată prin transformare în compuşi cu structură cunoscută.

Dintre alcoolii monoterpenelor monociclice, cei mai cunoscuţi sunt mentolul şi α-terpineolul:



Mentol Carvomentolul α-Terpineol

Mentolul are 3 centre de chiralitate în moleculă şi poate fi găsit în natură sub forma celor 4 racemici scindabili în enantiomeri. In natură, în uleiul de izmă se găseşte numai mentol levogir. Structura lui a fost dovedită prin obţinere din 3 -metil - 6-izopropilfenol (timol) prin hidrogenare:



Timol Mentol

Prin oxidarea mentolului se obţine mentona. Ea se află de asemenea în uleiul de izmă, însă a fost obţinută şi în laborator, prin sinteză.

Carvomentolul nu se găseşte în uleiuri eterice.

α-Terpineolul are un miros puternic de liliac şi se întrebuinţează în parfumerie. Se prepară pe scară mare din terpin prin deshidratare, la încălzire cu acid sulfuric diluat:



Terpin α-Terpineol; β-Terpineol

Terpinul la rândul său, se obţine prin hidratarea limonenului în mediu acid, dar a fost obţinut şi prin sinteză.

1.2.1.3. MONOTERPENE SI MONOTERPENOIDE BICICLICE.

Terpenele din această subclasă au formula moleculară $C_{10}H_{16}$ şi conţin în moleculă două cicluri şi o dublă legătură C=C. Prin hidrogenarea lor se obţin 7 sisteme ciclice, fundamentale, saturate, cu un ciclu de 6 atomi de carbon. Dintre acestea, cele mai importante sunt pinanul, bornanul şi izocamfanul.



Pinan Bornan Izocamfan

Pinanul şi bornanul (numit uneori şi camfan) pot fi consideraţi ca derivaţi de la mentan prin participarea

radicalului izopropil la o punte în poziţia meta, respectiv para, iar izocamfanul este deosebit de aceştia.

Grupa pinanului

Principalul constituent al uleiului de terebentină este α-pinenul, alături de care se găseşte în proporţie mai mică β-pinenul.

α- Pinen β- Pinen

Structura α - pinenului a fost determinată de către Wagner prin reacţii de degradare oxidativă. Printr-o serie de reacţii, din care prezentăm doar doi intermediari, s-a ajuns la acidul norpinic:



α-Pinen Acid pinonic Acid pinic Acid norpinic

Formarea acidului norpinic constituie o dovadă pentru prezenţa inelului ciclobutanic în molecula α-pinenului.

β -Pinênul, prin ozonoliză, formează nopinona,



β -Pinen Nopinonă

o cetonă prezentă alături de acidul pinonic,pinic şi norpinic în amestecul de produşi rezultaţi la oxidarea fracţiunii cu t.f. 155-165°C, izolată din uleiul de terebentină. De aici se deduce că în respectiva fracţiune se află şi β-pinen, alături de α-pinen.

Multe din reacţiile α-pinenului au loc cu rearanjarea scheletului pinonic. Wagner a constatat că dacă se barbotează acid clorhidric gazos în pinen la temperaturi scăzute (t= -15°C) se obţine clorhidratul de pinen şi care la temperaturi mai mari (t > 0°C) se transformă în clorură de bornil. Aceeaşi comportare o prezintă şi β-pinenul:



α-Pinen β-Pinen Clorhidrat de pinen Clorură de bornil

Pentru transpoziţia clorhidratului de pinen în clorură de bornil, Wagner şi Meerwein au propus formarea intermediară a doi carbocationi organici:



Actualmente se admite că intermediar se formează un carbocation neclasic, care poate fi atacat de anionul clorură numai din partea mai puţin aglomerată steric:



Ion clasic   Ion neclasic   Clorură de bornil

Prin această transpoziţie, din pinen se obţine clorura de bornil, care este un compus solid cu miros asemănător cu cel al camforului.

Grupa bornanului (camfanului)

Cel mai important compus din această grupă este camforul. El se poate obţine din lemnul arborelui de camfor prin distilare cu vapori de apă.



Camfor

Datorită constantei sale crioscopice foarte mari, camforul este folosit la determinarea de mase moleculare. Se mai utilizează camfor la obţinerea de celuloid şi de asemenea în medicină. Acidul camfor-sulfonic, obţinut prin sulfonarea camforului la gruparea metil de la un centru de chiralitate, este folosit la separarea bazelor racemice în enantiomeri.

Prin sinteză, camforul se poate obţine din izocamfen prin următoarele etape:



Izocamfen Acetat de izobornil Izoborneol Camfor

Prin reducerea camforului se obţine un amestec de doi alcooli stereoizomeri, numiţi borneol şi izoborneol. Borneolul se mai poate obţine din α-pinen prin adiţie de apă în mediu acid:



α- Pinen Borneol

Se observă că ionul neclasic poate fi atacat de apă numai din zona „ endo "adică din interiorul unghiului diedru format de cele două plane. S-a dedus că izoborneolul, celălalt izomer steric, este izomerul exo, relaţia dintre cei doi borneoli fiind de izomerie exo-endo.



Izoborneol

Borneolul se găseşte în multe uleiuri eterice, ca de exemplu, în cel de odolean, iar izoborneolul nu se găseşte în natură, dar se obţine uşor din izocamfen prin adiţie de apă în mediu acid, sau prin tratare cu acid acetic şi apoi hidroliză.

1.2.2. SESQUITERPENE SI SESQUITERPENOIDE

Sesquiterpenele sunt hidrocarburi cu formula $C_{15}H_{24}$ şi pot fi aciclice, monociclice (cu trei duble legături), biciclice (cu două duble legături), sau triciclice, cu o dublă legătură . Au aspectul unor uleiuri vâscoase cu t.f.= 250-280°C. Se cunosc şi alcooli şi cetone derivând de la aceste hidrocarburi.

1.2.2.1. ACICLICE

Farnesenul cu formula $C_{15}H_{24}$ este o hidrocarbură care a fost identificată în uleiul volatil de muşeţel. El se poate obţine din farnesol ($C_{15}H_{26}O$) prin deshidratare.



Farnesol

Farnesen

Farnesolul se găseşte în uleiul de mărgăritel, de flori de tei şi de ylang-ylang. Izomer cu el este nerolidolul, care se găseşte în balsamul de Peru şi în uleiul de neroli.



Nerolidol

Structura acestor substanţe a fost stabilită prin degradare oxidativă şi prin sinteză. Locul dublelor legături a fost stabilit prin ozonoliză. Din farnesol, în acest mod, s-a obţinut acetonă, levulin-aldehidă şi aldehidă glicolică:



Farnesol

Nerolidolul, la încălzire cu anhidridă acetică, suferă o izomerizare asemănătoare cu a linaloolului şi trece în farnesol, ceea ce înseamnă că între farnesol şi nerolidol este acelaşi tip de izomerie ca aceea dintre geraniol şi linalool.

1.2.2.2. CICLICE

O sesquiterpenă monociclică este bisabolenul, care este foarte răspândit în natură. El se află în uleiurile de bergamot, lămâie şi ace de molid. A fost sintetizat şi din nerolidol prin acţiunea acidului formic:



Nerolidol Bisabolen

Cele mai importante sesquiterpene ciclice sunt azulenele. Ele au fost obţinute pentru prima dată din fracţiile superioare ale unor uleiuri eterice prin încălzire în mediu oxidant. Astfel guaiolul, un alcool izolat din uleiul de lemn de guaiac, la încălzire cu sulf se dehidrogenează şi formează S-guaiazulenă („S" derivă de la sulf) .



Guaiol S-Guaiazulenă

Un izomer al ei este vetivazulena preparată prin reducerea şi apoi aromatizarea β - vetivonei, o cetonă sesquiterpenică conţinută în uleiul de vetiver:



β - Vetivonă Vetivazulenă

Azulena nesubstituită conţine un inel ciclopentanic condensat cu altul cicloheptanic şi are 5 duble legături; numele sistematic al azulenei este deci biciclo [5,3,0] decapentaena. Structura azulenei a fost stabilită prin numeroase sinteze. Astfel, scheletul azulenic a fost sintetizat prin condensarea indanului cu ester diazoacetic:



Azulena cristalizează în foiţe de culoare albastră (de unde derivă numele) iar mirosul este asemănător cu cel al naftalinei, al cărei izomer este. Comportarea chimică indică un caracter intermediar între cel nesaturat polienic şi cel aromatic.

Se observă că se poate spune că în molecula azulenei există anionul ciclopentadienil şi cationul tropiliu, fiecare în parte având caracter aromatic.

1.2.3. DITERPENE . DITERPENOIDE

Diterpenele propriu-zise, $C_{20}H_{32}$, sunt uleiuri vâscoase cu puncte de fierbere ridicate care se obţin din materiale vegetale prin extracţie cu dizolvanţi. Se cunosc diterpene aciclice, mono-, bi-, şi triciclice, precum şi alcooli, fenoli şi acizi cu schelet diterpenic. Interes deosebit prezintă fitolul şi acizii din răşinile de conifere.

Fitolul are formula moleculară $C_{20}H_{40}O$:

şi este o componentă a clorofilei. Prin oxidare cu ozon, fitolul formează aldehida glicolică şi o cetonă nesaturată cu formula $C_{18}H_{36}O$ care s-a dovedit a fi trimetilpentadecanonă:



Condensarea fitolului cu 2-metil-1,4-dihidroxinaftalina urmată de oxidarea produsului de reacţie cu oxid de argint duce la vitamina K_1:



Vitamina K_1 joacă un important rol în procesul de coagulare a sângelui (lipsa ei prelungeşte timpul de sângerare).

Fitolul poate fi de asemenea utilizat la sinteza vitaminelor E (tocoferoli).Astfel prin condensarea trimetilhidrochinonei cu fitolul se obţine α- tocoferolul :



α- Tocoferol

Vitaminele E intervin în procesele de oxidare celulară, în metabolismul glucidic şi în cel al creatinei din muşchi. Lipsa lor provoacă degenerarea muşchilor.

1.2.4. TRITERPENE.TRITERPENOIDE

Cea mai cunoscută hidrocarbură din această clasă este squalenul ($C_{30}H_{50}$). El a fost izolat pentru prima dată din ficat de rechin, dar ulterior s-a dedus că este foarte răspândit în natură, deoarece este intermediar în biosinteza sterolilor în organismele vii:



Squalen

Se poate observa că molecula squalenului este formată din două jumătăţi identice, construite fiecare conform „regulei izoprenice" din 3 resturi de izopren legate „cap-coadă" şi împreunate „coadă-coadă" la mijlocul moleculei.

Analiza cristalografică cu raze Roentgen a squalenului indică o configuraţie trans pentru toate legăturile duble din moleculă.

1.2.5. CAROTINOIDE.(TETRATERPENE).

Carotinoidele sunt pigmenţi naturali, galbeni, portocalii sau roşii sintetizaţi de organismele vegetale şi introduse în organismele animale prin hrană.Culoarea lor se datoreşte numărului mare de duble legături conjugate.

Dintre hidrocarburile carotinoidice cea mai cunoscută este licopina (licopenul).Ea are formula $C_{40}H_{56}$. Are culoarea roşie şi este colorantul din pătlăgelele roşii. Se găseşte însă şi în multe alte specii vegetale. Deoarece prin hidrogenare catalitică un mol de licopină absoarbe 13 moli de hidrogen, s-a dedus că ea conţine 13 legături duble în moleculă. Folosindu-se reacţii de degradare cu ozon, cu permanganat de potasiu sau cu acid cromic, s-a ajuns la concluzia că structura licopinei este:



Licopina

Molecula licopinei este compusă din două jumătăţi identice,simetrice. Fiecare jumătate este compusă din 4 resturi izoprenice, legate cap la coadă iar la mijlocul moleculei se inversează modul de legare al resturilor izoprenice. Acest principiu constructiv sugerează ipoteza că planta construieşte moleculele carotinoidelor prin îmbinarea a două molecule de diterpenoid.

Cea mai răspândită carotinoidă în natură este β-carotina (β - carotenul). Ea se găseşte, alături de clorofilă şi de izomerul său mai puţin răspândit, α- carotina, în toate plantele verzi. In cantitate mai mare, β- carotina se găseşte în morcovi.

Deoarece un mol de β - carotină absoarbe 11 moli de hidrogen. s-a dedus că în molecula β - carotinei se află 11 duble legături alchenice, iar deoarece prin oxidare cu $KMnO_4$ dintr-un mol de β -carotină se formează 4 moli de acid piruvic, înseamnă că în catenă se află 4 grupe laterale metil. Identificarea şi a altor produşi la degradarea cu ozon sau cu $KMnO_4$ în mediu acid a condus la următoarea structură:



β - Carotină

Pentru confirmarea structurii, β - carotina a fost obţinută şi prin sinteză (ca şi licopina , dealtfel).

Compuşii oxigenaţi din clasa carotinoidelor conţin grupe hidroxil,carbonil sau epoxidice. Alcoolii din această clasă se numesc xantofile. Dintre ele, cea mai răspândită este luteina. Ea este de culoare galbenă şi însoţeşte clorofila şi carotenii în plantele verzi. Are rol în absorbţia luminii în procesul de fotosinteză. Prin reacţii de degradare oxidativă şi de hidrogenare catalitică, pentru luteină s-a dedus următoarea structură:



Luteină

Analogul dihidroxilat al β-carotinei (ambele inele sunt β - iononice) se numeşte zeaxantina şi este colorantul galben din bobul de porumb.

Inrudite cu carotinoidele sunt vitaminele A. In organismele animale, inclusiv în cel uman, β -carotina suferă o scindare oxidativă la dubla legătură centrală şi formează o aldehidă numită retinal şi care prin reducerea enzimatică

se transformă în retinol (vitamina A_1).



Se observă că în structura vitaminei A_1 precum şi în aceea a retinalului toate dublele legături au configuraţie trans, motiv pentru care vitamina A_1 se mai numeşte all-trans retinol (trans-total), iar retinalul rezultat din β - caroten este numit all-trans retinal (trans-total). In ficatul mamiferelor există enzime care transformă all-trans retinolul în 11-cis retinol şi din care prin oxidare se obţine 11-cis-retinalul, substanţă implicată în procesul vederii.

In organele microscopice din retină, numite conuri şi bastonaşe, se găseşte pigmentul numit rodopsină sau purpura vizuală. Acesta este de fapt o bază Schiff rezultată prin reacţia dintre 11-cis-retinal şi o grupare amino dintr-o proteină numită opsină. Prin absorbţia unei cuante de lumină, 11-cis-retinalul din rodopsină trece în trans-total retinal, iar pigmentul se numeşte metarodopsină. Acest proces este însoţit de un impuls asupra nervului optic şi care se transmite la creier. In acest moment începe ciclul vizual:



Această regenerare a rodopsinei se face în ficat, la întuneric, dar se poate face şi în retină la lumină cu ajutorul unor enzime care izomerizează trans- retinalul

în 11-cis retinol.

1.2.6. BIOSINTEZA TERPENELOR SI TERPENOIDELOR

Cercetările biochimice au arătat că nu izoprenul ca atare este precursorul terpenoidelor în plante. Terpenele, respectiv terpenoidele se formează în organismele vii prin condensarea unor unități biogenetice C_5. Aceste unități sunt izopentenil- şi dimetilalil-pirofosfatul („izopren" activ). Acestea la rândul lor se obțin din acetilcoenzimă A prin intermediul acidului mevalonic:





(Dimetilalil-pirofosfat)

In continuare, prin condensarea izopentenil-pirofosfatului cu dimetilalil-pirorosfatul se formează pirofosfat de geranil, iar procesul continuă astfel:





β - Pinen

α - Pinen

Terpenele superioare se obțin după următoarea schemă:

Geranil-pirofosfat (C_{10})

↓ + C_5

Farnesil- pirofosfat ⟶ Sesquiterpene (C_{15})

↓ + C_5

C_{20}- Pirofosfat ⟶ Diterpene (C_{20})

↓

C_{40}- Pirofosfat ⟶ Carotinoide (C_{40})

De asemenea, prin condensarea a două molecule de farnesil-pirofosfat se formează squalenul, iar din acesta sub influența enzimelor din ficat se ajunge la colesterol. Trebuie remarcat că în acest fel prin intermediul acetil-coenzimei A rezultată din metabolismele lipidic și glucidic se face legătura acestora cu izoprenoidele.

1.2.7. STEROIDE

1.2.7.1. GENERALITATI

Steroidele constituie o mare şi foarte importantă clasă de compuşi care au în comun sistemul hidrocarbonat tetraciclic al perhidrociclopentanofenantrenului care are în poziţiile 10 şi 13 câte o grupare metil, iar în poziţia 17 o catenă hidrocarbonată.



Din steroide fac parte următoarele grupe de compuşi: steroli, acizi biliari, hormoni steroizi, genine şi sapogenine.

Condensarea între inelele A şi B poate fi cis sau trans, iar condensările dintre inelele B-C şi C-D sunt trans. Atomii de hidrogen sau grupele de atomi de la centrele de chiralitate se notează convenţional cu β, dacă sunt deasupra planului general al moleculei şi cu α dacă sunt orientate sub acest plan. Grupele metil de la C_{10} şi C_{13} sunt considerate deasupra planului (prin convenţie). In formulele de proiecţie în plan, legăturile β se reprezintă prin linii pline (sau îngroşate) iar α, prin linii punctate. Studiile conformaţionale au arătat că în marea lor majoritate, moleculele steroidelor au grupele metil de la C_{10} şi C_{13} în poziţie axială, iar catena de la C_{17} în poziţie ecuatorială.

Se obişnuieşte să se împartă steroidele în două serii:

- normală, în care joncţiunea inelelor A şi B este cis, iar hidrogenul din poziţia 5 are orientare β ;

- allo, în care joncţiunea inelelor A şi B este cis, iar hidrogenul din poziţia 5 are orientare α .

Dacă radicalul de la C_{17} este C_8H_{17}, de la seria <u>normală</u> derivă coprostanul, iar de la seria <u>allo</u> colestanul.





Colestanul





Coprostanul

1.2.7.2. STEROLI

Sterolii sunt alcooli cu schelet steroidic, iar gruparea hidroxil se află în poziţia 3. După provenienţă, sterolii se clasifică în zoosteroli (se găsesc în regnul animal), fitosteroli (vegetali) şi micosteroli (se găsesc în drojdii şi fungi).

Dintre zoosteroli, cel mai important este colesterolul. Se observă că grupele metil de la C_{10} şi C_{13} sunt axiale, iar grupa hidroxil are orientarea ecuatorială (toate steroidele care au gruparea hidroxil din poziţia 3 orientată axial, adică invers faţă de colesterol, se desemnează prin prefixul <u>epi</u>).



Colesterol
(formulă de proiecţie)



Colesterol
(formulă conformaţională)

Colesterolul se găseşte în toate ţesuturile organismului animal, dar mai ales în creier,măduvă,glanda suprarenală şi în gălbenuşul de ou. Depozitarea colesterolului în peretele arterial favorizează ateroscleroza şi hipertensiunea arterială, iar depozitarea în ficat determină calculii biliari, de unde a fost izolat pentru prima dată.

Structura colesterolului a fost stabilită prin difracţie cu raze Roentgen, dar a fost determinată şi prin sinteză de Woodward şi colaboratorii în 1952.

Un alt zoosterol este 7-dehidrocolesterolul. El este prezent în concentraţie însemnată în piele, iar sub acţiunea luminii formează colecalciferolul (vitamina D_3), care reglează depunerea normală a fosfatului de calciu în oase.



7-Dehidrocolesterol

Colecalciferol

Dintre fitosteroli prezintă importanţă stigmasterolul, care se găseşte în bobul de soia, iar dintre micosteroli amintim ergosterolul, care se află în drojdie.



Stigmasterol



Ergosterol

Ergosterolul prezintă un interes deosebit deoarece prin iradiere cu lumina UV se transformă în ergocalciferol (Vitamina D_2).



Ergosterol   Ergocalciferol

De fapt, vitamina D_2 este un amestec de 2 izomeri geometrici care se obţin din ergosterol prin intermediul precalciferolului:



Ergosterol Precalciferol



Cei 2 izomeri ai vitaminei D_2 se interconvertesc prin rotaţie în jurul legăturii C_6–C_7, adică sunt izomeri s-cis şi respectiv s- trans.

Descoperirea structurii vitaminelor D constituie un exemplu de cercetare sistematică şi complexă. In anul 1919 s-a observat de către medici că rahitismul se poate vindeca prin expunerea bolnavilor la soare, dar mai bine prin iradiere cu lumină ultravioletă. Efectul terapeutic era asemănător cu cel obţinut când s-a folosit untură de peşte. Mai târziu s-a observat că acelaşi rezultat se obţine prin iradierea hranei bolnavului. S-a dedus că în pielea bolnavilor şi în hrană există o substanţă numită provitamină D şi care se transformă în vitamina D sub acţiunea luminii ultraviolete. Ulterior au fost supuse iradierii diferite componente ale hranei şi s-a stabilit că grăsimile şi în special cele nesaponificabile dobândesc sub acţiunea luminii ultraviolete

activitate biologică. Dar grăsimile nesaponificabile constau în cea mai mare parte din steroli. In consecinţă s-au iradiat diferiţi steroli.

Colesterolul pur, spre deosebire de cel impur, nu a devenit activ biologic prin iradiere. S-a înregistrat spectrul UV-Vis al colesterolului impur şi s-a observat că acesta prezintă o bandă de absorbţie cu λ_{max} =280 nm, spre deosebire de colesterolul pur care prezintă absorbţie maximă la o lungime de undă mai mică. De aici s-a dedus că acea impuritate cu λ_{max} = 280 nm trebuie să fie tot un sterol. Dintre toţi sterolii cunoscuţi pe atunci, doar ergosterolul prezenta absorbţie maximă la 280 nm. Intr-adevăr, prin iradierea ergosterolului cu lumină ultravioletă s-a obţinut vitamina D_2 în stare cristalizată. Dar, colesterolul, un sterol de origine animală nu putea avea ca impuritate ergosterol, un sterol vegetal. S-a sintetizat 7-dehidrocolesterolul, un sterol cu două legături duble olefinice , ca şi ergosterolul. Prin iradierea acestuia s-a obţinut un compus cu activitate biologică de vitamină D. Acesta s-a numit vitamina D_3 şi s-a dovedit a fi identică cu vitamina din untura de peşte.

In 1959 s-a realizat sinteza totală a vitaminei D_3 şi astfel structura acesteia a fost determinată.

1.2.7.3. ACIZI BILIARI

Derivă de la coprostanol (cu inelele A şi B în poziţie cis). Ei se găsesc în bilă (fierea secretată de ficat) sub formă de amide cu glicocolul sau taurina. Au rolul de a emulsiona grăsimile, făcând astfel posibilă trecerea lor prin peretele intestinal.

Acidul colic (acidul 3,7,12-trihidroxicolanic) se găseşte de regulă sub formă de glicocolat sau taurocolat de sodiu.



Glicocolat de sodiu

Se mai cunosc şi alţi acizi biliari: acidul dezoxicolic (3,12-dihidroxicolanic), chemodezoxicolic (7,12-dihidroxicolanic) şi litocolic (acidul 3- hidroxicolanic).

Din punct de vedere biogenetic, acizii biliari derivă de la colesterol, fapt dovedit prin introducerea în organism de colesterol marcat cu izotopul ^{14}C şi izolarea acizilor biliari marcaţi cu acest izotop.

Dacă toate grupele hidroxil din acizii colici sunt înlocuite cu hidrogen (de exemplu, prin deshidratare urmată de hidrogenare) se obţine acidul colanic, care a putut să fie obţinut prin oxidarea coprostanului.



Coprostan Acid colanic

In acest fel s-a dedus că acizii biliari au scheletul ciclic al coprostanului. Doar hidroxilul din poziţia 3 a acizilor biliari are orientare ecuatorială, celelalte grupări hidroxil sunt axiale. Din această cauză, hidroxilul din poziţia 3 se

acilează cel mai uşor şi se oxidează cel mai greu. Cel mai uşor se oxidează hidroxilul din poziţia 7.

Relaţia structurală dintre acizii biliari a fost determinată ţinând cont de aceste observaţii:



1.2.7.4. HORMONI STEROIZI

Prin biotransformarea colesterolului în organismele animale se obţin şi hormoni steroizi. Ei pot fi produşi de cortexul glandei suprarenale (hormonii corticosteroizi) sau de glandele sexuale (hormonii sexuali).

Dintre hormonii corticosteroizi cei mai importanţi sunt cortizona, cortizolul şi corticosterona:



Corticosterona



Cortizona



Cortizolul

Hormonii sexuali sunt de două feluri : masculini (androgeni) şi feminini , care pot să fie estrogeni şi progestageni. Cel mai important hormon sexual masculin este testosterona. Ea controlează procesele fundamentale necesare dezvoltării şi funcţionării organelor sexuale, precum şi apariţia şi întreţinerea caracterelor sexuale masculine secundare.



Testosterona



Estradiol



Estrona (Foliculina)

Hormonii sexuali feminini estrogeni sunt produşi de folicul. Dintre ei cel mai important este estradiolul. Produsul său de metabolizare este estrona. Se observă că aceşti hormoni au ciclul A aromatic şi deci gruparea hidroxil din poziţia 3 are caracter fenolic.

Hormonii sexuali feminini progestageni sunt produşi de „corpus luteum" (corpul galben). Dintre ei cel mai important este progesterona:



Progesterona

Hormonii sexuali feminini controlează dezvoltarea aparatului reproducător feminin, apariţia şi menţinerea caracterelor sexuale feminine secundare, reglează ciclul ovarian,fecundaţia,gestaţia, naşterea şi lactaţia.

1.2.7.5. GENINE SI SAPONINE

Diferite specii de Digitalis conţin glicozide ale unor alcooli steroidici care pot fi folosite în tratarea unor boli cardiovasculare. Agliconii acestor glicozide se numesc genine. Acţiunea cardiotonică a glicozidelor de acest tip este determinată în principal de aglicon şi anume de catena laterală lactonică a acestuia. Agliconii liberi sunt otrăvuri foarte puternice.

Extracţia glicozidelor din plante se face cu metanol sau etanol apos. Astfel din planta Digitalis purpureea (Degeţelul roşu.) se obţine glicozida numită digitalină, iar din Digitalis lanata au fost izolate trei glicozide numite digilanide. Din Strophanthus Kombé au fost izolate de asemenea trei glicozide. Din extractele de digitalină şi de digilanide prin hidroliză acidă sau enzimatică se obţine digitoxigenina,iar din glicozidele izolate din Strophanthus Kombé

Similar, prin condensarea guanidinei cu ester cianacetic, nitrozare, reducere şi apoi condensare cu acid formic se obţine guanidina.

Pentru calea (b) de sinteză se foloseşte ca precursor 5-amino-4-carboxamidă-imidazol, iar ca agent de condensare se utilizează tot acidul formic:



Hipoxantina

2.8.1.3. PROPRIETATI CHIMICE.

Purinele pot fi N-alchilate şi N-oxidate, dar reacţia este dependentă de substituenţi şi de reactant. Astfel purina este convertită în 9-metilpurină prin reacţie cu sulfat de metil în soluţie apoasă, iar adenina poate fi alchilata la N-9, N-3 şi N-1 în alte condiţii. Prin reacţie cu peroxizi adenina se oxidează la N-1 iar guanina la N-3.

Substituţiile electrofile au loc la C-8, dar nu au valoare preparativă. In schimb, o importanţă mare prezintă reacţiile de substituţie nucleofilă. Astfel, prin reacţia hidroxipurinelor cu oxiclorură de fosfor se obţin cloropurine, iar acestea îşi pot substitui selectiv atomii de clor cu grupe amino:



Ordinea de înlocuire a atomilor de clor scade în ordinea 8 >6 >2. In acest mod din 2,6,8-tricloropurină prin tratare cu hidroxid de sodiu apos se obţine 8-hidroxi-2,6-dicloropurina:



2.8.1.4. REPREZENTANTI MAI IMPORTANTI.

Adenina și guanina fiind componente ale acizilor nucleici apar în celula vie. Se găsesc și în stare liberă în natură dar în concentrații mici. Prin metabolizare aceste baze purinice se transforma în acid uric și se elimină sub această formă.

Acidul uric se găsește în mici cantități în sânge, de unde trece în urină. In cazuri patologice, se depune la rinichi sub forma de urat de sodiu sau de potasiu (cel mai acid atom de hidrogen este cel din poziția 8). Acidul se prezintă ca o pulbere cristalizată, incoloră și inodoră. La încălzire se descompune fără a se topi. Este greu solubil în apă, ceea ce înseamnă că majoritatea moleculelor preferă forma lactamică.

Xantina se găsește în mici cantități în sânge și în urină. Ca și acidul uric, xantina formează săruri cu metalele alcaline, dar are, spre deosebire de acidul uric, și caracter slab bazic. Drept urmare, cu acidul clorhidric concentrat formează un clorhidrat.

Hipoxantina se găsește atât în regnul animal cât și în cel vegetal. Se obține ca și xantina, prin hidroliza acizilor nucleici. Este o pulbere cristalină, la încălzire nu se topește, ci se descompune. Formează săruri atât cu bazele cât și cu acizii.

Cafeina (1,3,7-trimetilxantina) se găsește în frunzele de ceai negru (< 5%), în nucile de cola (< 3%) și în boabele de cafea (< 1%). Este excitant al sistemului nervos central și un stimulent al inimii.

Teofilina (1,3- dimetilxantina) se află alături de cafeină în frunzele de ceai. Este un diuretic puternic.

Teobromina (3,7-dimetilxantina) se găseşte în boabele de cacao (< 1%). Este un diuretic foarte puternic.

2.8.2. PTERIDINA.

Nucleul pteridinic se poate obţine din 4,5-diaminopirimidină şi glioxal prin condensare:



Pteridina este o substanţă solidă, galbenă, uşor solubilă în apă. Hidroxi- şi amino-pteridinele prezintă, ca şi derivaţii corespunzători ai purinelor, tautomerie lactam-lactimică, respectiv amino-iminică.

Un derivat foarte important al pteridinei este acidul folic.



6-Metilpterină | Acid p-aminobenzoic | Acid glutamic

El se poate obţine prin condensarea 2,4,5-triamino-6-hidroxipirimidinei cu acroleină bromurată şi cu acidul p-aminobenzoilglutamic şi se mai numeşte acid pteroilglutamic:



Acid pteroilglutamic

In organismul uman acidul folic este sintetizat de flora intestinală, iar sub forma acidului tetrahidrofolic el participă la diviziunea celulară, fiind un factor de creştere.

2.8.3. ALOXAZINA.

Nucleul aloxazinic se obţine prin condensarea o-fenilendiaminei cu aloxan:



Importanţa ei constă în faptul că intră în structura vitaminei B_2:



Vitamina B_2 se găseşte în toate celulele vii, dar apare în cantităţi mai mari în lapte, drojdie de bere şi în ouă. Importanţa ei constă în aceea că intră în structura coenzimelor unor dehidrogenaze numite flavoproteine. Se cunosc dehidrogenaze care au drept coenzimă flavin-adenin-dinucleotida (FAD), sau flavin-adenin-mononucleotida (FMN).

Structura FAD-ului este următoarea:



2.9. ACIZI NUCLEICI.

Acizii nucleici sunt componente nelipsite ale tuturor celulelor vii. Ei sunt responsabili cu păstrarea, transmiterea caracterelor ereditare, dar şi cu biosinteza proteinelor. In organismele vii acizii nucleici sunt legaţi de proteine cu caracter bazic (histone,protamine), alcătuind aşa-numitele nucleoproteine.

Acizii nucleici sunt compuşi macromoleculari rezultaţi prin policondensarea unor unităţi mai simple numite mononucleotide, ceea ce înseamnă că ei sunt polinucleotide. La rîndul lor, nucleotidele sunt compuse din nucleozide şi acid fosforic, iar nucleozidele conţin o bază purinică sau pirimidinică condensată cu riboză sau dezoxiriboză.

Se cunosc două tipuri de acizi nucleici: acizi dezoxiribonucleici (ADN), localizaţi în nucleele celulelor şi care conţin dezoxiriboză şi respectiv acizi ribonucleici ARN localizaţi în plasma celulară şi care conţin riboză.

In ADN se găsesc două baze purinice: adenina şi guanina ca şi două baze pirimidinice: citozina şi timina. In ARN se găsesc aceleaşi baze purinice şi citozina, iar în locul timinei apare uracilul.

Exemple de nucleozide:

Adenozină



Timidină

Formula generală a unei nucleotide este:

unde R provine de la baza azotată purinică sau pirimidinică. Dacă R=adenina, nucleotida se va numi acid adenozin-5-fosforic (sau acid adenilic).

Dacă un nucleozid este di- sau trifosforilat se obţin nucleotid-di- sau trifosfaţi. In cazul adeninei ca bază azo-

tată se obţin adenozin-difosfatul (ADP) şi adenozin-trifosfatul (ATP):



← ATP

Acidul adenozin-trifosforic (ATP) nu intră în structura acizilor nucleici. Deoarece conţine legături macroergice (prezentate cu simbolul ~) prin hidroliza cărora se degajă o mare cantitate de energie, ATP-ul constituie un rezervor de energie pentru reacţiile metabolice. Reacţiile endergonice, consumatoare de energie, din metabolismul glucidic nu primesc energie decât de la ATP care se transformă în ADP şi furnizează energia necesară.

In acizii nucleici mononucleotidele sunt unite între ele prin grupările hidroxil din poziţiile 3'şi 5' ale pentozei. In consecinţă, un fragment dintr-un ADN arată astfel:



unde R=rest provenit de la adenină(A), guanină(G), citozină(C) şi respectiv timină(T).

Se observă că gruparea hidroxil din poziţia 5' a unui nucleotid este legată de gruparea hidroxil din poziţia 3' a altuia printr-o legătură fosfat-diesterică .Fiecare catenă

polipeptidică va avea două capete: capătul 5' la care gruparea hidroxil de la C_5, este liberă şi capătul 3' la care gruparea hidroxil de la C_3, nu este angajată într-o legătură internucleotidică. Prin convenţie, structura unei catene polinucleotidice se scrie întotdeauna cu capătul 5' în stânga şi cu capatul 3' în dreapta. Dacă două lanţuri polinucleotidice se derulează în acelaşi sens 5' → 3', se spune că sunt paralele, iar dacă unul se derulează în sensul 5'→3', iar celălalt în sensul 3'→5', se spune că sunt antiparalele.

In funcţie de provenienţă, macromoleculele acizilor nucleici conţin de la câteva mii la câteva milioane de mononucleotide. Structura catenelor lor a fost clarificată prin analiza cu raze Roentgen de către Watson şi Crick în anul 1953, pentru care ulterior au primit premiul Nobel. Conform celor doi cercetatori, macromoleculele de ADN sunt formate din două catene răsucite în spirală (elice dublă). Bazele purinice şi pirimidinice se află în interiorul elicei, iar resturile de pentoză şi de fosfat în exteriorul ei. Intre resturile de baze purinice şi pirimidinice se formează legături de hidrogen intercatenare care contribuie la menţinerea secvenţei, ordinii nucleotidelor, în elicea dublă.



Elice dublă



Adenină=Timină



Guanină≡Citosină

Legăturile de hidrogen sunt posibile numai între o anumită purină şi o anumită pirimidină, adică axistă aşa numitele perechi de baze azotate: adenină-timină şi guanină-citozină. Nu se pot împerechea două baze purinice deoarece s-ar depăşi spaţiul interior oferit de elicea dublă (cca 2 nm), iar două baze pirimidinice nu se pot împerechea, adică nu pot forma legături de hidrogen între ele, deoarece sunt prea departe una de alta. In consecinţă, succesiunea, secvenţa bazelor azotate dintr-o catenă, dictează secvenţa în cealaltă catenă.

Prin hidroliza totală în mediu bazic a unei macromolecule de ADN s-a găsit dezoxiriboză, acid fosforic, adenină în procent egal cu cel de timină şi guanină in procent egal cu cel de citozină, ceea ce confirmă structura propusă şi apoi determinată de Watson şi Crick.

Macromoleculele de ARN sunt monocatenare. Prin hidroliza totală a lor s-au găsit riboză, acid fosforic, adenină în procent diferit de cel de uracil şi guanină în procent diferit de cel de citozină, ceea ce este în acord cu structura monocatenară.

Se cunosc 3 tipuri de acizi ribonucleici: mesager, de transfer şi ribosomal. ARN-ul mesager este sintetizat în nucleul celular pe o matriţă de ADN. Ajunge apoi în citoplasmă, la ribosomi (numiţi şi corpusculii lui Palade) unde va servi ca matriţă pentru sinteza unui polipeptid cu o anumită secvenţă de aminoacizi. ARN-ul de transfer aduce anumiţi aminoacizi din citoplasmă la ribosomi. Fiecăruia din cei 20 de aminoacizi care intră in structura proteinelor îi corespunde cel puţin un ARN de transfer. ARN-ul ribosomal intră în structura ribosomilor, sediul biosintezei proteinelor.

In ceea ce priveşte rolul ADN-ului în păstrarea şi transmiterea caracterelor ereditare, trebuie spus că informaţia genetică este înscrisă în ADN sub forma unei secvenţe formate din câte 3 nucleotide (secvenţă numită „cod genetic").

Prin gruparea celor 4 baze azotate câte 3 se pot forma $4^3=64$ combinaţii diferite, care pot codifica toţi cei 20 de aminoacizi. Din cele 64 de combinaţii de mononucleotide, 3 codifică terminarea, încheierea sintezei unei catene polipeptidice. Mai rămân 61 combinaţii (numite, de regulă, codoni) care codifică 20 de aminoacizi, ceea ce determină degenerarea codului genetic. Majoritatea aminoacizilor sunt codificaţi de mai mulţi codoni.

Macromoleculele de ADN păstrează informaţia genetică, iar aceasta este „transcrisă" pe ARN-ul mesager. Acesta ajunge apoi la ribosomi, în citoplasmă, unde serveşte sintezei proteinelor. Un anumit codon de pe ARN-ul mesager şi anume A-U-G (adenina-uracil-guanină) determina iniţierea sintezei unei proteine cu ajutorul metioninei. In continuare, nu este acceptat la sinteză orice aminoacid. Următoarea tripletă de pe ARN-ul mesager stabileşte anticodonul, adică tripleta de nucleotide de pe ARN-ul de transfer care aduce aminoacizi, iar acesta decodifică (aduce) un anumit aminoacid. In prezenţa unei enzime, din cei doi aminoacizi se formează o dipeptidă. Apoi reacţia se deplasează spre următoarea secvenţă de codoni ai ARN-ului mesager, care stabileşte anticodonul, iar acesta permite fixarea unui nou aminoacid în catena polipeptidică. La un moment dat, pe catena ARN-ului mesager urmează un codon terminator, ceea ce face ca sinteza să se oprească. In acest fel este verificată, controlată, sinteza proteinelor, spre a se evita sinteza unor proteine anormale.

3. ALCALOIZI HETEROCICLICI.

Alcaloizii sunt substanţe naturale de origine vegetală ce conţin azot (de regulă sub formă de heterociclu) şi care au o importantă acţiune fiziologică asupra omului sau altor animale. Incă din antichitate, oamenii au cunoscut acţiunea puternic toxică, sau curativă, a anumitor plante sau

extracte din plante.Astfel opiul,un material răşinos obţinut din seminţele unor specii de mac, era folosit în Orient încă din Antichitate ca somnifer. Acţiunea antimalarică a cojii de cincona şi efectul stimulant asupra inimii al frunzelor de coca au fost cunoscute în America de sud încă înainte de venirea spaniolilor. Astăzi, toata lumea cunoaşte acţiunea puternic otrăvitoare a mătrăgunei, măsălariţei şi cucutei.

Termenul „ alcaloid " a fost introdus de farmacistul austriac Meissner în anul 1819 cu ocazia extracţiei veratrinei din Veratrum album şi arată importanţa acordată caracterului bazic (alcalin) al acestora. Totuşi, începutul chimiei alcaloizilor este marcat de izolarea morfinei, principalul alcaloid din opiu,de către Serturner în anul 1806. Ulterior au fost izolaţi stricnina, brucina, cafeina, chinina, coniina şi alţi alcaloizi. Coniina este primul alcaloid la care i s-a determinat structura chimică în anul 1870 şi care a fost obţinut apoi prin sinteză în anul 1889.

Cercetarea chimică a alcaloizilor a constituit şi constituie o preocupare permanentă a multor chimişti organicieni. S-a demonstrat că mulţi alcaloizi au structuri chimice foarte complicate, care a necesitat folosirea metodelor fizice sau fizico-chimice moderne. Prima etapă în determinarea structurii unui alcaloid o constituie extracţia lui din materialul vegetal în care se află sub formă de sare cu un acid organic (lactic,citric,malic,aconitic ,tartric,oxalic sau acetic). Pentru aceasta se tratează planta mărunţită sau extractul ei apos cu o bază (hidroxid alcalin, de calciu sau de amoniu), după care alcaloidul sub formă de bază este extras cu cloroform sau clorură de metilen. Extractul este apoi agitat cu o soluţie apoasă acidă (acid organic sau anorganic) pentru ca alcaloizii sub formă de sare să se dizolve în stratul apos. Acesta se separă şi prin alcalinizare precipită alcaloizii sub formă de amestecuri. Separarea şi purificarea lor se face prin precipitare fracţionată, distilare fracţionată sau prin diferite tehnici cromatografice.

Un alcaloid nu se află decât într-o singura specie de plante, dar de obicei este însoţit de alţi alcaloizi cu structură asemănătoare. Conţinutul în alcaloizi al unei plante variază mult cu zona geografică, clima şi anotimpul. Multe plante tropicale cu un conţinut bogat în alcaloizi, transplantate în zone cu clima temperată sau rece îşi pierd proprietatea de a sintetiza alcaloizi. Trebuie remarcat că multe plante nu sintetizează alcaloizi. Rezultă că alcaloizii nu îndeplinesc în plante o funcţiune fiziologică de importanţă vitală, cum îndeplinesc de ex.hidraţii de carbon, aminoacizii sau grăsimile. Asupra rolului alcaloizilor în organismul vegetal s-au elaborat mai multe teorii, însa există argumente pro şi contra pentru fiecare dintre acestea. S-ar putea ca rolul alcaloizilor în plante să fie numai de apărare contra insectelor sau a altor duşmani.

In prezent se cunosc mai mult de 5000 de alcaloizi, dar la mulţi dintre ei nu li se cunoaşte structura exactă. Majoritatea sunt substanţe cristalizate, iar unii alcaloizi sunt amorfi sau se află în stare lichidă. Aproape toţi alcaloizii sunt incolori, mulţi sunt optic activi şi se găsesc în plante sub forma unuia din cei doi stereoizomeri sau a racemicului. In general, sunt insolubili sau greu solubili în apă, dar solubili în solvenţi organici nepolari.

Cu toate că au structuri diferite, majoritatea alcaloizilor se comportă similar faţă de unii reactivi, reactivi generali ai alcaloizilor, cu care formează complecşi coloraţi sau precipitate. Dintre reactivii de culoare amintim reactivii Frohde (soluţie de molibdat de amoniu în acid sulfuric concentrat); Mandelin (vanadat de amoniu în acid sulfuric) sau Wenzel (soluţie de permanganat de potasiu). Cei mai cunoscuţi reactivi de precipitare ai alcaloizilor sunt reactivii Dragendorff (soluţie apoasă de iodobismutat de potasiu), Bouchardat (soluţie apoasă de iod/iodură de potasiu), acizii fosfomolibdenic, fosfowolframic precum şi sărurile unor metale grele (clorură mercurică). Atât reacţiile de culoare cât şi cele de precipi-

tare nu sunt suficient de specifice pentru identificarea unui alcaloid, dar, utilizate alături de alte metode sunt utile.

Structura chimică a alcaloizilor este foarte diferită şi uneori foarte complicată. Conţin în structura lor unul sau mai mulţi atomi de azot care se găsesc într-un heterociclu sau sub formă de grupare amino primară,secundară, terţiară sau sare cuaternară de amoniu. In structura alcaloizilor se găsesc aproape toate heterociclurile cu azot, dar se cunosc şi alcaloizi neheterociclici. Cei mai importanţi din această categorie sunt efedrina şi adrenalina:



(-) Efedrina



(-) Adrenalina

Alcaloizii nu sunt denumiţi după structura lor chimică, deoarece ei au fost mai întâi izolaţi, studiate proprietăţile lor fiziologice şi abia ulterior li s-a determinat structura chimică.

Unii alcaloizi au fost denumiţi ţinând cont de specia vegetală din care au fost izolaţi pentru prima oară, ca de ex. papaverina (izolată din Papaver somniferum) şi nicotina (izolată din Nicotina tabacum). In alte cazuri, denumirea ţine cont de activitatea fiziologică (morfina,emetina),de unele proprietăţi (higrina) sau de numele descoperitorului (pelletierina, izopelletierina).

Alcaloizii heterociclici se împart în 12 grupe, corespunzătoare structurilor de bază, dintre care cele mai importante sunt:

- grupa pirolului şi pirolidinei (higrina,stachidrina).
- piridinei şi piperidinei (coniina,nicotina,anabasina).

- tropanului (atropina,hiosciamina,cocaina).
- chinolinei (chinina,cinconina,chinidina).
- izochinolinei (papaverina,morfina,codeina).
- indolului (stricnina,reserpina,yohimbina,br
- imidazolului (pilocarpina).

3.1.ALCALOIZI DIN GRUPA PIROLULUI SI PIROLIDINEI

3.1.1. HIGRINA.

A fost izolată din frunzele de coca. Se poate sintetiza în felul următor:



Nu prezintă acţiune farmacodinamică însemnată.

3.2. GRUPA PIRIDINEI SI PIPERIDINEI.

3.2.1. CONIINA.

Coniina a fost izolata din seminţele şi din sucul de cucută în care se găseşte sub formă de sare cu acidul malic.

Structura sa a fost demonstrată prin tratare cu pulbere de zinc şi apoi oxidare cu permanganat de potasiu:



Coniina Acid picolinic

Sinteza coniinei care este totodată prima sinteză a unui alcaloid natural a fost realizată de Ladenburg în 1886, pornind de la α-picolină:



Coniina este o otravă foarte puternică. Ea produce paralizia nervilor motori, iar in doze mari produce moartea prin paralizia centrului respirator . In anticnitate sucul de cucută se folosea pentru executarea condamnaţilor la moarte.

3.3. ALCALOIZI CU UN INEL PIRIDINIC LEGAT DE ALTUL PIROLIDINIC SAU PIPERIDINIC.

3.3.1. NICOTINA.

Nicotina este principalul alcaloid din Nicotina tabacum însoţit însă, în plantă, de alţi 11 alcaloizi ce apar în cantităţi mult mai mici, ca de ex. nornicotina şi anabasina.



Nicotina

In frunzele de tutun, nicotina se găseşte sub forma sărurilor cu acizii citric sau malic. Nicotina brută se poate obţine din frunzele de tutun prin tratare cu soluţie de hidroxid de calciu, antrenare cu vapori de apă şi extracţie cu un dizolvant nepolar.

Nicotina pură este un lichid incolor, parţial miscibilă cu apa, dar solubilă în dizolvanţi organici. Este o otravă foarte puternică, deoarece este un excitant al nervilor centrali şi periferici, ea provoacă şi o creştere importantă a tensiunii arteriale.

Structura nicotinei a fost demonstrată prin reacţii de degradare. Astfel prin distilarea nicotinei cu pulbere de zinc şi oxid de calciu se formează piridină, pirol şi metilamină, iar prin oxidarea nicotinei cu acid azotic sau permanganat de potasiu se obţine acid nicotinic.



O primă sinteză a nicotinei a fost realizată de Pictet în anul 1904 din sarea acidului mucic cu β-aminopiridina prin piroliză:



In continuare, β-piridil-N-pirolul trece prin încălzire în C-piroldérivat şi care apoi se transformă în nicotină prin reacţiile următoare:



Un izomer al nicotinei, care se găseşte de asemenea în frunzele de tutun este anabasina (α-piperidil- β-piridina).



Fumul de ţigară conţine nicotină, dar şi alţi alcaloizi. Ca rezultat al arderii tutunului se formează un gudron din care s-au izolat hidrocarburi aromatice polinucleare cancerigene. Cancerul pulmonar este, din acest motiv, mai răspândit printre fumătorii de ţigarete şi în special printre fumătorii care folosesc pipa.

3.4. ALCALOIZI DIN GRUPA TROPANULUI.

3.4.1. ATROPINA.

Atropina este esterul acidului levo-tropic cu tropina:



Tropina Atropina

Dacă în locul acidului levo-tropic se folosește acid tropic racemic se obține alt alcaloid, numit hiosciamină. Acești alcaloizi, alături de scopolamină, se găsesc în mătrăgună și măsălariță.

Nucleul de bază pe care se află grefată grupa esterică se numește tropan, care rezultă, formal, prin condensarea unui inel piperidinic cu unul pirolidinic.



Atropina a fost izolată din mătrăgună în anul 1831, iar structura ei a fost elucidată în 1897 și confirmată prin sinteză de Wiellstaetter în anul 1902.

Structura tropinei a fost determinată prin reacții de degradare. Astfel, prin oxidare blândă, tropina trece în cetona corespunzătoare numită tropinonă și care prin condensare crotonică cu benzaldehida formează un derivat dibenzilidenic, iar prin oxidare trece în acidul tropinic.



Acid tropinic

Acesta din urmă prin metilare totală, transformare în bază cuaternară de amoniu și piroliză, formează un aminoacid nesaturat, din care prin metilare totală, transformare în bază cuaternară și piroliză se obține acidul -2,4-dien- 1,7-heptan-dioic, care prin hidrogenare trece în acid pimelic:



S-a dedus în acest fel că în tropină se află 7 atomi de carbon. Dacă s-au aplicat tropinei aceleaşi reacţii s-a ajuns la tropilidenă (cicloheptatrienă). Astfel,s-a dedus că cei 7 atomi de carbon din tropină formează un ciclu . Tot prin reacţii chimice s-a determinat gruparea N-metil precum şi hidroxilul alcoolic secundar. Prin esterificarea tropinei cu acid levo-tropic s-a obţinut atropina.

Aceste studii degradative l-au condus pe Robinson la sinteza tropinei prin următoarea metodă elegantă:



Dialdehidă succinică

Tropină

Această metodă a fost propusă în anul 1917, ea este relativ simplă şi a putut fi folosită la obţinere de mari cantităţi de atropină, spre deosebire de prima sinteză, a lui Willstaetter din anul 1902, care pornea de la cicloheptanonă şi cuprindea 20 de etape dificile.

Atropina exercită o puternică acţiune asupra sistemului nervos parasimpatic. Ea produce şi o relaxare a muşchilor netezi, odată cu atenuarea durerilor care însoţesc stările spastice. Introdusă în cantitate mică în ochi, atropina dilată pupila şi din această cauză se foloseşte în oftalmologie.

3.4.2. COCAINA.

Cocaina este un ester dublu al unui hidroxiaminoacid numit ecgonină cu alcoolul metilic şi cu acidul benzoic.

Ecgonina   Cocaina

Cocaina a fost izolată în anul 1860 din frunzele de coca (specia Erytroxylon). Structura ecgoninei a fost determinată prin următoarele reacţii : oxidarea cu acid cromic conduce la un acid β-cetonic care prin decarboxilare trece în tropinonă. Formarea tropinonei dovedeşte că gruparea hidroxil ocupă aceeaşi poziţie ca în tropină. Oxidarea energică a ecgoninei a condus la un amestec de acid tropinic şi acid ecgoninic, iar aceasta dovedeşte că gruparea carboxil se află în inelul piperidinic.



Existenţa inelului pirolidinic în structura ecgoninei şi deci şi a cocainei s-a demonstrat prin izolarea N-metilsuccinimidei din amestecul rezultat la oxidarea energică.



N- Metilsuccinimidă

Cocaina a fost primul anestezic local folosit, dar ea este şi un excitant puternic al scoarţei cerebrale. Produce o stare de excitaţie euforică, dispariţia oboselii, dar deoarece produce dependenţa sunt necesare doze din ce în ce mai mari, şi apare toxicomania gravă (cocainomania) care se manifestă, printre altele, cu dezechilibru psihic şi idei fi[illegible]

3.5. ALCALOIZI CU UN NUCLEU CHINOLINIC SI ALTUL CHINUCLIDINIC.

3.5.1. CHININA.

Chinina se găseşte în coaja arborilor din speciile Cincona şi Remizia, originari din regiunile înalte ale Anzilor, alături de alt alcaloid numit cinconină.



Chinina

Ea a fost izolată în anul 1820 de Pelletier şi Caventou. Este greu solubilă în apă, dar solubilă în alcool şi eter.

Structura chininei a fost determinată prin mai multe reacţii. Prin reacţie cu iodură de metil se obţine un produs dimetilat ceea ce înseamnă că în chinină se găsesc doi atomi de azot. Sub acţiunea acidului iodhidric din chinină se eliberează iodură de metil, iar aceasta sugerează existenţa unei grupe metoxi. Grupa hidroxil a fost pusă în evidenţă prin benzoilare cu clorură de benzoil, iar dubla legătură alchenică a reieşit din faptul că la oxidarea chininei cu permanganat s-a obţinut un acid cu un atom de carbon mai puţin. Prin oxidarea energică a chininei cu acid cromic s-au obţinut acidul chininic şi merochinenul.

Acidul chininic s-a dovedit a fi un derivat al chinolinei, iar din merochinen prin oxidare s-au obţinut succesiv acizii cincoloiponic şi loiponic, amândoi fiind derivaţi ai piperidinei:



A. chininic Merochinen A. cincoloiponic A. loiponic

Se poate însă observa că atât merochinenul cât şi acizii cincoloipinic şi loiponic conţin o grupare amino secundară, care nu apare în structura chininei. Pasteur a observat că în mediu acid şi la cald chinina se izomerizează în chinotoxină, care conţine o grupare amino secundară şi care a fost sintetizată prin condensarea esterului acidului chininic cu esterul homomerochinenului:



Chinotoxină

Atomii de azot din chinină s-a dovedit a fi terţiari şi că nu sunt legaţi de radicali alchil, iar merochinenul conţine un atom de azot secundar. Inseamnă că la formarea merochinenului se deschide un ciclu. Acesta nu poate fi situat decât în partea nearomatică a moleculei de chinină, deoarece cealaltă parte este chinolinică, iar nucleul chinolinic se regăseşte în acidul chininic. S-a admis că partea nearomatică

a chininei conţine un sistem biciclic azotat, cu punte, de tip special, numit chinuclidinic:



Chinuclidină

Confirmarea structurii, presupuse după cum s-a arătat mai sus, a fost făcută de Woodward şi Doering în anul 1944, care pornind de la 7-hidroxiizochinolină au ajuns la esterul homomerochinenului şi pe care l-au condensat cu un ester al acidului chininic. S-a obţinut astfel chinotoxina de la care prin tratare cu hipobromit,eliminare de acid bromhidric şi reducere s-a ajuns la chinină.

Chinina este un foarte bun medicament antimalaric, ce acţionează prin distrugerea parazitului care provoacă boala. Până la al doilea război mondial cea mai mare parte din sulfatul de chinină se obţinea de pe plantaţiile de Cincona din Asia de sud-est. Ocuparea acestor teritorii de către japonezi a determinat obţinerea chininei precum şi a primachinei şi clorochinei (alte medicamente antimalarice) prin sinteză:



Primachină



Clorochină

3.6. ALCALOIZI CU NUCLEU IZOCHINOLINIC.

3.6.1. PAPAVERINA.

Papaverina este un alcaloid care alături de peste 20 alţi alcaloizi, se găseşte în opiu adică în sucul lăptos al fructelor necoapte ale unor specii de mac, ca de ex. specia Papaver somniferum. A fost izolată din opiu în anul 1848 de către Merck.



Papaverină

Analiza elementară şi funcţională au arătat că papaverina conţine 4 grupări metoxi şi un atom de azot. Prin topire alcalină sau prin degradare oxidativă din papaverină s-au obţinut următorii compuşi:



Din structura acestor produşi de degradare reiese că în molecula papaverinei restul dimetoxibenzilic este legat în poziţia 1 a izochinolinei.

Structura papaverinei a fost confirmată de către **Pictet** (1909) din ω-aminoacetoveratronă şi clorura acidului **homoveratric:**



ω-Aminoacetoveratrona necesară a fost sintetizată din veratrol astfel:



Papaverina are acţiune antispastică. Ea relaxează vasele coronariene în stare de spasm, motiv pentru care se foloseşte în diferite afecţiuni cardiovasculare.

3.6.2. MORFINA.

Se găseşte în concentraţie relativ mare în opiu (ajunge uneori până la 20%). A fost descoperită de Serturner în anul 1806, formula sa structurală a fost propusă de Robinson în 1925 , iar sinteza totală a fost realizată prin foarte multe etape între anii 1951-1956, de către Gates şi Tschudi.



Morfină

Tebaină

Ea este însoţită de codeină (metoxi-derivatul fenolic al morfinei) şi tebaina (dimetoxi-derivat).

O primă indicaţie cu privire la structura acestor alcaloizi s-a obţinut prin distilarea morfinei şi codeinei cu pulbere de zinc. In aceste condiţii din amestecul de reacţie s-a izolat fenantrenul, ceea ce sugerează existenţa acestui nucleu în structura lor. Din codeină prin metilare cu iodură de metil se obţine o sare cuaternară, care transformată în hidroxid şi supusă pirolizei formează ca produs principal o amină terţiară numită α-metilmorfimetină cu acelaşi număr de atomi de carbon:



Codeină

α - Metilmorfimetină

Dacă α-metilmorfimetina este tratată cu anhidridă acetică şi acid clorhidric se obţine NN-dimetiletanolamina şi metilmorfolul. Ultimul compus conţine nucleul fenantrenic şi se obţine uşor prin sinteza Pschorr.



Metilmorfol

Uşurinţa eliminării N,N-dimetiletanolaminei urmată de aromatizare sugerează că această catenă a fost grefată pe un carbon cuaternar. Locul celui de al treilea atom de oxigen a fost stabilit pornindu-se tot de la codeină. Aceasta prin oxidare blândă trece în codeinonă şi care prin fierbere cu anhidridă acetică trece în 3-metoxi-4,6-dihidroxifenantren şi O-acetil-N-metiletanolamină.



De asemenea prin demetilarea codeinei, prin încălzire cu clorhidrat de piridină, s-a obţinut morfina.

In acest fel a fost determinată structura unei mari părţi din morfină. Locul de sudură al punţii $-CH_2-CH_2-N-CH_3$ şi poziţia dublei legături au fost determinate mult mai greu, din cauza transpoziţiilor moleculare ce pot avea loc în cursul reacţiilor. Din această cauză, de-a lungul timpului au fost propuse mai multe formule de structură pentru morfină. Dintre acestea, formula propusă de Robinson şi prezentată mai sus prevede toate reacţiile constatate experimental. Determinările cu raze Roentgen (Crawfort-Hodkin, 1955) au condus la configuraţia morfinei



Morfină
(formulă de configuraţie)

Relaţiile structurale dintre morfină,codeină şi tebaină au fost determinate astfel: morfina prezintă o grupare hidroxil alcoolică şi una fenolică iar datorită ultimei grupări morfina se dizolvă in soluţii alcaline . Prin metilarea morfinei se obţine codeina. Aceasta nu se mai dizolvă în hidroxizi alcalini, ceea ce inseamnă că s-a metilat hidroxidul fenolic. Tebaina prin hidroliza cu acid sulfuric diluat se transformă în codeinonă şi metanol, iar de aici rezultă că tebaina este esterul metilic al formei enolice a codeinonei şi care la rândul ei se obţine din codeină prin oxidare blândă.

Pentru sinteza totală a morfinei Gates şi Tchudi au pornit de la naftalină şi au parcurs 18 etape. Această sinteză nu prezintă importanţă economică, deoarece morfina obţinută din opiu este mult mai ieftină.

Morfina are un efect deprimant asupra sistemului nervos central, producând insensibilitate faţă de durere. In doză mare este un narcotic puternic, putând produce pierderea cunoştiinţei şi comă. Efectul deprimant este precedat de o stare de bună dispoziţie. Prin întrebuinţare repetată, organismul se obişnuieşte (apare dependenţa) şi sunt necesare doze din ce în ce mai mari pentru a se produce acelaşi efect. Intoxicaţia cronica se manifestă prin slăbire fizică şi scăderea facultăţilor intelectuale. La suprimarea drogului apar spasme dureroase ale unor grupe musculare, anorexie,vărsături,diaree, insomnie.

Efecte similare prezintă heroina (derivatul O-diacetilat al morfinei).

Codeinei îi lipsesc proprietăţile narcotice ale morfinei, iar proprietăţile analgezice sunt mult mai diminuate. Sub formă de codeinfosfat sau codamină,codeina serveşte la combaterea tusei.

Tebaina este un toxic puternic. Produce convulsii şi stimulează secreţia glandelor sudoripare.

3.7. ALCALOIZI CU UN NUCLEU INDOLIC.

3.7.1. ALCALOIZI DIN ERGOT.

Ergotul (cornul secarei) este produsul unei ciuperci parazite ce creşte pe diferite graminee, dar mai ales pe secară. In afară de aminoacizi şi de amine biogene, ergotul conţine 12 alcaloizi care prin hidroliză alcalină formează acid lisergic.



Acid lisergic

Acidul lisergic este o substanţă cristalină, greu solubilă în solvenţi organici neutri, dar solubilă în piridină. Prin reducere cu sodiu şi alcool amilic, sau catalitic, acidul lisergic trece în acid dihidrolisergic, de unde rezultă prezenţa unei legături duble olefinice în moleculă.El formează săruri doar cu un echivalent de acid , ceea ce dovedeşte că doar un atom de azot , din cei doi determinaţi prin analiza elementară, are caracter bazic. Reacţia Zerivitinov arată prezenţa unui atom de hidrogen activ, în afară de cel din gruparea carboxil, iar aceasta sugerează prezenţa unei grupe -NH- în moleculă. Pentru aceasta pledează şi reacţia de condensare a acidului lisergic cu p-dimetilaminobenzaldehidă,reacţie specifică indolului şi pirolului. Prin topirea alcalină a acidului lisergic se obţine şi 3,4-dimetilindol, iar prin oxidare cu acid azotic se obţine betaina acidului N-metilchinoliltetracarboxilic şi care prin distilare cu calcesodată trece în N-metilchinolină. Aceste reacţii arată că prin oxidare se distruge nucleul indolic, iar gruparea $N-CH_3$ trebuie să se afle în celelalte două inele ale moleculei.

Sinteza totală a acidului lisergic a fost realizată de Woodward în perioada 1954-1956. Pentru aceasta s-a plecat de la acidul N-benzoil-2,3-dihidroindolil-3-propionic, care a fost transformat în clorură acidă şi apoi a avut loc o ciclizare intramoleculară.



Cetona rezultată s-a bromurat la metilenul din poziţia α, iar bromcetona a fost condensată cu etilenacetalul N-metilamino-acetonei:



Hidroliza urmată de condensarea crotonică intramoleculară a ultimului produs conduce la un compus tetraciclic:



In continuare, prin N-acetilare şi reducerea grupării cetonice cu borohidrură se obţine alcoolul corespunzător. De la acest alcool prin tratare cu clorură de tionil se înlocuieşte gruparea hidroxil cu clor, iar prin tratare succesivă cu cianură de sodiu şi apoi hidroliză se obţine acidul dihidrolisergic. Dehidrogenarea poziţiilor 2,3 conduce la acidul lisergic racemic:



Acid lisergic Acid dihidrolisergic

Dintre alcaloizii din ergot amintim ergobasina, care este amida acidului lisergic cu 2-amino-1-propanolul şi ergotamina în care gruparea carboxil a acidului lisergic este implicată într-o legătură peptidică care face parte dintr-o catenă polipeptidică policiclică.

Ergotamina măreşte tonusul şi contracţiile uterine, precum şi contracţiile musculaturii netede în general, determinând o vasoconstricţie renală şi coronariană. Este utilizată în tratamentul crizei migrenoase şi hemoragiilor post-partum.

Din acid lisergic prin sinteză s-a obţinut dietilamida cunoscută sub numele de LSD şi care este un compus deosebit de toxic. In doze chiar de zecimi de miligram produce halucinaţii şi inconştienţă prelungită.

3.7.2.YOHIMBINA.

Din coaja de yohimbehe s-au izolat mai mulţi alcaloizi în structura cărora intră un nucleu indolic, dintre care amintim yohimbina:



Structura ei a fost demonstrată prin reacţii de degradare alcalină şi oxidativă. Astfel, prin tratare cu seleniu la 250° din yohimbină rezultă, printre altele, tetrabirină şi cetoyobirină:



Cetoyobirină



Tetrabirină

La rândul lor, tetrabirina formează prin oxidare acid 2,4,5-piridintricarboxilic, iar cetoyobirina prin topire alcalină formează acid 2,3-dimetilbenzoic. In acest fel s-au pus în evidenţă ciclurile D şi respectiv E. Poziţia grupării hidroxil, semnalată de analiza funcţională, a fost determinată prin distilare cu zinc , reacţie care a condus şi la mici cantităţi de harman şi para-cresol.

Structura yohimbinei a fost confirmată prin sinteza totală realizată de Van Tammelen în anul 1958.

Yohimbina are acţiune antagonistă adrenalinei asupra sistemului nervos simpatic, provocând o dilatare a vaselor sanguine periferice. Coaja de yohimbehe a fost folosită mult timp ca afrodisiac de locuitorii din Camerun şi Congo.

3.7.3. STRICNINA.

Este un alcaloid cu structură heptaciclică. Ea se află în semințele şi frunzele de turta-lupului (Strychinos nux vomica) alături de brucină.



Stricnină

Stricnina este o bază tare, monoacidă, unul din cei doi atomi de azot, conținut sub forma unei grupe amidice, nu are caracter bazic. Prezența nucleului indolic a fost dovedită prin oxidare cu acid azotic,care duce la acidul 5,7-dinitro-indol-2-carboxilic, acid picric şi 3,5-dinitrobenzoic. Pe baza acestor reacții de degradare, ca şi a altora, s-a propus o formulă de structură pentru stricnină, care apoi a fost confirmată prin analiza cristalografică. O sinteză totală a stricninei a fost realizată de Woodward şi colaboratorii în anul 1954 în aproximativ 30 de etape.

Stricnina este o otravă extrem de puternică. Ea acționează asupra sistemului nervos central, producând convulsii tetaniforme ale muşchilor. Este folosită în medicină ca stimulant şi tonic în astenii gripale şi neurastenii. Doza letală este de 0,030 g (la om).

4. COLORANTI.

4.1. DEFINITIE SI CLASIFICARE.

Se numesc coloranţi substanţele care absorb radiaţii luminoase din vizibil (400-800nm) şi care au proprietatea de a se fixa pe fibre textile sau alte materiale. De fapt, substanţele colorante (vopselurile) se pot clasifica în coloranţi propriu-zişi şi pigmenţi. Deosebirea dintre cele două clase de substanţe colorante constă în aceea că, spre deosebire de coloranţii propriu-zişi, pigmenţii sunt insolubili în mediul prin intermediul căruia ei sunt aplicaţi. Particulele de pigment se fixează pe diferite materiale prin intermediul unui polimer, în timp ce coloranţii sunt aplicaţi dintr-un lichid în care ei sunt complet, sau parţial solubili.

Se mai deosebesc coloranţi naturali şi sintetici, iar aceştia la rândul lor pot fi anorganici sau organici.

In scop didactic, coloranţii se clasifică după structura lor chimică. Se deosebesc coloranţi arilmetinici, chinonici, azinici, azoici, de sulf, fenolftaleinici, reactivi, etc. Prezintă importanţă practică o altă clasificare şi anume aceea care ţine cont de proprietăţile lor tinctoriale (coloristice). Din acest punct de vedere, coloranţii se clasifică în: coloranţi substantivi, de cadă, de developare, de mordanţi, de dispersie, acizi, bazici, etc.

Există şi clasificări fără importanţă practică. Astfel se pot deosebi coloranţi de absorbţie, coloranţi fluorescenţi şi coloranţi cu transfer de energie, după cum energia luminoasă absorbită este disipată predominant prin conversie internă, fluorescenţă sau respectiv prin încrucişare intersistem.

O altă clasificare ţine cont de utilizarea coloranţilor. Se deosebesc astfel coloranţi pentru laseri, pentru cristale lichide, coloranţi utilizaţi în tehnica fotografică, în industria alimentară etc.

Societăţile specialiştilor în coloranţi din Marea Britanie şi din Statele Unite înregistrează toţi coloranţii

cunoscuţi până acum printr-un aşa numit „ Colour Index "(C.I) care ţine cont de proprietăţile tinctoriale dar şi de structura chimică a colorantului respectiv. Astfel indantrona este înregistrată ca Albastru de cadă 4 şi are numărul C.I. 69800.

4.2. NOTIUNEA DE CULOARE.

Capacitatea de a absorbi selectiv radiaţii electromagnetice este o proprietate generală a materiei. Senzaţia de culoare reprezintă transpunerea pe creier a răspunsului retinei la excitarea acesteea cu radiaţii luminoase reflectate sau refractate de un corp. Spectrul radiaţiilor electromagnetice este foarte larg, dar ochiul omenesc nu sesizează decât radiaţii cu lungimea de undă cuprinsă între 400 şi 800 nm, domeniu cunoscut ca spectrul vizibil. Substanţele colorate au proprietatea de a absorbi energie radiantă din spectrul vizibil. In cazul când un corp absoarbe toate radiaţiile din domeniul vizibil el apare negru. Dacă însă este transparent la toate radiaţiile din vizibil, el va apare incolor. Un corp care reflectă toate radiaţiile din domeniul vizibil apare ca alb, iar dacă absoarbe o fracţiune din energia tuturor radiaţiilor cu λ cuprinsă între 400 şi 800 nm, el apare gri. Culorile negru,alb şi gri se numesc„acromatice". In schimb, corpurile care prezintă una sau mai multe benzi de absorbţie în acest domeniu spectral au culori „cromatice".De exemplu,un corp care are absorbţia maximă (λ max.) în intervalul 400-430 nm apare colorat galben. Analog benzile de absorbţie din intervalele 430-480, 480-550, 550-600 şi 600-700 nm determină culorile oranj, roşu, violet şi respectiv albastru.Corpurile care apar gri pot fi caracterizate prin două benzi de absorbţie în intervalele 400-450 şi 580-700 nm (după Zoolinger domeniul vizibil este cuprins între 400 şi 700 nm).

Trebuie arătat un corp care absoarbe o anumită culoare din spectrul vizibil apare colorat în culoarea complementară acesteea. Astfel dacă absoarbe culoarea albastră, apare colorat în galben, dacă absoarbe culoarea verde-albastru apare roşu,

iar când absoarbe două culori complementare apare alb.

Tabelul 1.

Relaţia între culoarea absorbită
şi culoarea văzută.

Lungimea de undă a radiaţiei absorbite (nm)	Culoarea absorbită	Culoarea văzută
400-435	Violet	Galben-verde
435-480	Albastru	Galben
480-490	Albastru-verde	Portocaliu
490-500	Verde-albastru	Roşu
500-560	Verde	Purpuriu
560-580	Galben-verde	Verde
580-595	Galben	Albastru
595-605	Portocaliu	Albastru-verde
605-760	Roşu	Verde-albastru

Când moleculele substanţelor organice sunt expuse la radiaţii ce acoperă un domeniu larg de lungimi de undă, ele absorb numai acele radiaţii a căror energie corespunde diferenţelor dintre nivelele de energie permise ale moleculei. Energiile corespunzătoare radiaţiilor din domeniile ultraviolet şi vizibil absorbite de o anumită moleculă provoacă rearanjări electronice, însoţite şi de schimbări în energia de rotaţie şi de vibraţie a acesteea.

Absorbţia luminii de către o moleculă este, de obicei, discontinuă şi spectrul de absorbţie electronică constă din una sau mai multe benzi de absorbţie. Acestea se datorează unor tranziţii electronice: $\sigma \to \sigma^*$, $\pi \to \pi^*$, $\pi \to \sigma^*$, $n \to \pi^*$, $n \to \sigma^*$, adică un electron migrează pe un orbital de energie superioară. Dezexcitarea moleculelor, adică revenirea lor din starea excitată, de energie superioară, în starea fundamentală sau într-o altă stare de energie inferioară, se poate face în mai multe feluri:

- prin reemiterea unei cuante de aceeaşi energie (fluores-

cenţă) sau de energie mai mică (fosforescenţă),

- conversie internă, când se trece într-o stare inferioară de energie, dar nu în starea fundamentală şi nu se emite energie (macroscopic se observă căldură).

- încrucişare intersistem; se trece de la o stare excitată de tip singlet (toţi electronii au spinii împerecheaţi) la starea corespunzătoare triplet (care are 2 electroni neîmperecheaţi), de energie inferioară (se observă căldura).

- reacţii fotochimice.

Folosirea coloranţilor în vopsitorie depinde nu numai de poziţia benzii de absorbţie, ci şi de intensitatea benzii de absorbţie, exprimată conform legii Lambert-Beer:

$$\log \frac{I_0}{I} = E = \varepsilon \cdot c \cdot l$$

unde ε = coeficientul molar de extincţie. Pentru coloranţii uzuali trebuie ca valoarea lui ε să fie cuprinsă în intervalul 10^4-10^5 litru.moli^{-1}.cm^{-1}. Astfel coloranţii triarilmetinici care au $\varepsilon \geq$ 100000 sunt eficienţi economic, în timp ce coloranţii antrachinonici sunt neeconomici, nu numai pentru că intermediarii lor sunt scumpi, ci şi pentru că ei au ε cuprins între 8000 şi 18000.

4.3. TEORII ASUPRA CULORII COMPUSILOR ORGANICI.

Dependenţa dintre structura chimică şi culoarea compuşilor organici a fost observată de mult timp, stabilirea de relaţii între acestea fiind o veche preocupare a cercetării chimice.

In anul 1869, Graebe şi Liebermann au observat că toţi coloranţii devin incolori la reducere. Pornind de aici, ei au considerat culoarea ca o consecinţă a nesaturării moleculelor. In anul 1876 Witt a elaborat teoria cromoforilor şi auxocromilor. In accepţiunea sa, cromoforii sunt grupe de atomi ce generează culoarea, iar auxocromii sunt substituienţi care,

grefaţi pe un cromofor, intensifică culoarea şi conferă totodată moleculei capacitatea de a se fixa pe un suport. In categoria cromoforilor au fost incluse grupele:

$>C=C<$, $>C=O$, $>C=S$, $>C=N-$, $-N=N-$,

iar în aceea a auxocromilor, grupările: $-OH$, $-NH_2$, $-NHR$, $-NR_2$.

In anul 1888 Armstrong şi Nietzki arată că apariţia culorii la compuşii organici este rezultatul trecerii moleculelor acestora de la structura benzoidă la cea chinoidă:



Incoloră Albastră

Pfeiffer, Dilthey şi Wizinger, în anul 1925, au arătat că un compus organic poate deveni colorat dacă el conţine în moleculă atomi coordinativ nesaturaţi (atomi cu un număr de substituenţi mai mic decât cifra lor de coordinaţie). Aceşti atomi absorb slab radiaţii luminoase, însă absorbţia se intensifică mult prin dobândireâ unei sarcini electrice, iar prin introducere de grupări auxocrome în moleculă sarcina electrică se stabilizează, culoarea se închide (deplasare spre roşu) şi se intensifică:



Incolor (λ_{max}= 264 nm) Galben (450 nm) Violet (590 nm)

In 1935 Bury explică apariţia culorii cu ajutorul teoriei rezonanţei. Conform celor arătate , deplasarea absorbţiei spre vizibil (apariţia culorii) se datoreşte scăderii diferenţei de energie dintre starea fundamentală (E) şi prima stare excitată a moleculei (E^*).

Teoria rezonanţei (mezomeriei) descrie starea fundamentală a moleculelor prin precizarea tuturor structurilor de rezonanţă. Prima stare excitată, la fel poate fi descrisă prin „suprapunerea" mai multor structuri de rezonanţă. Dacă starea excitată este stabilizată prin rezonanţă mai mult decât starea fundamentală, atunci nivelele lor energetice se apropie, iar aceasta determină deplasarea batocromă a absorbţiei maxime.

Numeroase studii efectuate până în prezent în scopul stabilirii de relaţii între structura chimică şi culoarea compuşilor organici au condus la următoarele reguli empirice:

- compuşii organici care au în moleculă una sau mai multe legături duble izolate absorb la lungimi de undă mici (200--300 nm). In schimb, prezenţa in moleculă a două sau mai multe legături duble conjugate deplasează maximul de absorbţie spre lungimi de undă mai mari.
- în cazul compuşilor aromatici cu inele condensate, absorbţia este deplasată batocrom, comparativ cu compusul cu acelaşi număr de nuclee aromatice, dar izolate. De exemplu, la benzen λ_{max}=256 nm, la naftalină λ_{max}=313 nm, iar la difenil λ_{max}=252 nm.
- introducerea unor substituenţi electronodonori (cu efect +E) sau electronoacceptori (cu efect -E) pe un ciclu aromatic sau în moleculele compuşilor cu duble legături conjugate are drept rezultat deplasarea maximului de absorbţie spre lungimi de undă mai mari (efect batocrom), şi intensificarea absorbţiei (efect hipercrom). In cazul substituenţilor donori are loc o conjugare de electroni $n \rightarrow \pi^*$, care produce o extindere a sistemului conjugat şi o mărire a mobilităţii electronilor, ceea ce are ca rezultat micşorarea energiei necesare excitării moleculelor. Substituenţii electronoacceptori produc o extindere a sistemului cromoforic, ceea ce duce tot la micşorarea energiei necesare excitării moleculelor. In consecinţă, tranziţia din starea fundamentală în prima stare excitată poate fi provocată şi de radiaţii cu energie mai mică şi deci lungime de undă mai mare (efect batocrom).

- prin formare de săruri, o serie de compuşi îşi închid culoarea (deplasare batocromă) şi o intensifică, fenomen cunoscut sub numele de halocromie (halos=sare, chromos=culoare). Deplasarea batocromă a maximului de absorbţie are loc însă numai atunci când prin formare de sare sistemul conjugat se extinde.

O condiţie esenţială pentru a exista conjugare într-un sistem polienic sau aromatic extins este ca acesta să fie plan. Deranjarea coplanarităţii sistemului duce la întreruperea conjugării electronilor π şi diferitele porţiuni ale sistemului cromofor vor absorbi independent lumină, ceea ce va avea ca efect deplasarea hipsocromă a maximului de absorbţie şi micşorarea coeficientului molar de extincţie.

La dizolvarea în diverşi solvenţi inerţi, multe substanţe organice îşi modifică culoarea. Acest fenomen a fost numit solvatocromie. Dintre factorii care îl generează amintim:

- deplasarea echilibrului unui sistem tautomer,
- stabilizarea diferită a stării fundamentale şi a stării excitate.

4.4 COLORANTI AZOICI.

Coloranţii azoici conţin grupe azo (-N=N-) legate de atomi de carbon cu hibridizare sp^2. In concordanţă cu numărul de astfel de grupe se disting coloranţi mono-, dis-, tris- şi tetrakis-azoici. In general, grupele azo sunt legate de inelul benzenic sau naftalinic, dar în anumite cazuri aceste grupe sunt grefate pe un heterociclu sau pe grupe alifatice enolizabile. Evident, toţi coloranţii azoici conţin în moleculă şi grupări auxocrome.

Se cunosc diferite metode de obţinere a coloranţilor azoici, dar cea mai utilizată este metoda cuplării unei sări de diazoniu cu un fenol sau amină aromatică. Deoarece ionii de diazoniu sunt agenţi electrofili slabi, numai compuşii aromatici cu substituenţi donori ca $-OH$, $-NR_2$, $-NHR$ sau

$-NH_2$ pot fi folosiţi drept componentă de cuplare. Fenolii participă la reacţia de cuplare în mediu bazic, iar aminele în mediu acid slab (pH=5-6):



Colorant hidroxiazoic



Colorant aminoazoic

Alte câteva posibilităţi cu aplicaţii restrânse de formare a coloranţilor azoici sunt următoarele:

- condensarea în mediu alcalin a unui nitrozoderivat cu o amină primară aromatică:

$$Ar - NO + H_2N - Ar' \longrightarrow Ar - N = N - Ar' + H_2O$$

- reducerea în condiţii blânde a unui nitroderivat aromatic, de exemplu cu Zn + NaOH:

$$2\ Ar - NO_2 + 8\ [H] \longrightarrow Ar - N = N - Ar + 4\ H_2O$$

- dehidrogenarea unei diarilhidrazine sub acţiunea unui oxidant:

$$Ar-NH-NH-Ar + [O] \longrightarrow Ar - N = N - Ar + H_2O$$

Condensarea unei arilhidrazine cu o chinonă sau chinonimină, rezultând chinonarilhidrazonă, tautomeră cu derivatul azoic corespunzător:



Se cunosc coloranţi azoici acizi, bazici, direcţi (substantivi), de dispersie, de developare şi reactivi.

Dintre coloranţii azoici acizi cel mai cunoscut este metiloranjul, un colorant care în mediu acid are culoarea roşie iar în mediu bazic culoarea portocalie:



Culoare roșie

Metiloranjul se foloseşte doar ca indicator de pH şi se obţine prin diazotarea acidului sulfanilic şi cuplare cu N,N-dimetilanilină.

Galbenul de anilină este cel mai simplu colorant azoic bazic şi se obţine din anilină prin diazotare şi cuplarea sării de diazoniu tot cu anilină:

$$C_6H_5NH_2 \xrightarrow[H_2SO_4]{NaNO_2} C_6H_5-\overset{+}{N}\equiv N]\ HSO_4^- \xrightarrow[-\ H_2SO_4]{+\ C_6H_5-NH_2}$$



Diazoaminobenzen

p- Aminoazobenzen
(Galben)

În mediu acid, datorită unei structuri chinoide, p-aminoazobenzenul capătă culoarea albastră:



Culoare albastră

Galbenul de anilină vopseşte lâna şi mătasea, dar nu este rezistent la spălare.

Un colorant azoic direct, foarte cunoscut, este roşu de Congo. El se obţine din benzidină prin diazotare şi cuplare cu acidul naftionic:



El vopseşte direct (fără mordansare) fibrele de bumbac, in sau cânepă, dar este utilizat şi ca indicator de pH (roşu în mediu bazic şi albastru în mediu acid).

Importanţă practică prezintă coloranţii azoici acizi cromatabili. Aceştia conţin unităţi structurale care pot forma combinaţii complexe cu ionul de crom (sau cu ionii altor metale tranziţionale). Cel mai simplu colorant de acest tip este „ Portocaliul acid cromatabil ".



El se obţine prin diazotarea p-nitroanilinei şi cuplare cu acid salicilic.

4.5. COLORANTI ARILMETINICI.

4.5.1. GENERALITATI.

Aceşti coloranţi derivă formal de la difenilmetan sau trifenilmetan. Vechea denumire de coloranţi arilmetanici, care presupunea hibridizarea sp^3 a atomului de carbon central, a fost, la propunerea lui Zollinger, înlocuită cu denumirea de coloranţi arilmetinici, deoarece atomul de carbon central are hibridizarea sp^2.

Toţi coloranţii arilmetinici conţin în poziţia para faţă de atomul de carbon central grupări amino sau hidroxil. Produsele cu o singură grupă de acest tip nu prezintă importanţă practică, iar la atomul central din moleculele tuturor coloranţilor arilmetinici nu sunt atomi de hidrogen.

Compuşii arilmetinici fac parte din primele sortimente de coloranţi organici realizaţi prin sinteză. Rezistenţele acestor coloranţi la lumină şi la spălare sunt în general slabe, deşi strălucirea şi puritatea nuanţelor este remarcabilă. In prezent ei servesc la colorarea hârtiei, la prepararea cernelurilor şi tuşurilor poligrafice şi ca indicatori.

4.5.2. COLORANTI DIARILMETINICI.

Din această categorie fac parte două produse, puţin importante din punct de vedere practic, Auramina O şi Auramina G. Auramina O poate fi reprezentată prin următoarele structuri mezomere:



Prin încălzirea soluţiei apoase de Auramină O peste 70°C aceasta hidrolizează şi formează N,N'-tetrametildiaminobenzofenonă (cetona lui Michler):



Auramina O se mai poate sintetiza în felul următor:



Ea vopseşte în galben fibrele celulozice mordansate cu tanin, dar culoarea nu este rezistentă la lumină.

Auramina G are structura următoare



şi nu prezintă însemnătate practică.

4.5.3. COLORANTI TRIARILMETINICI.

4.5.3.1. METODE GENERALE DE PREPARARE.

In majoritatea cazurilor se prepară mai întâi un compus diarilmetanic şi din care se sintetizeaza apoi colorantul triarilmetinic. Intermediarii diarilmetanici se obţin prin mai multe metode.

a) Prin tratarea aminelor aromatice primare,secundare sau terţiare, având liberă poziţia para faţă de gruparea amino, cu formaldehidă în mediu acid:



4,4'-Diaminodifenilmetan

b) Prin încălzirea fenolului cu formaldehidă în acid sulfuric rezultă 4,4'-dihidroxidifenilmetan:



In locul fenolului se pot utiliza şi alţi hidroxiderivaţi aromatici.

c) Prin tratarea N,N- dialchilanilinelor cu fosgen în prezenţă de clorură de zinc anhidră rezultă 4,4'-N,N'-tetraalchildiaminobenzofenone:



Transformarea acestor derivaţi diarilmetanici în coloranţi triarilmetinici se poate face după cum urmează:

a) tratarea unui amestec format dintr-o bază 4,4'-diaminodiarilmetanică şi o amină aromatică cu un agent oxidant (nitrobenzen,CrO_3,clorură ferică,acid arsenic).



b) oxidarea unui 4,4'-diaminodiarilmetan la benzhidrol sau reducerea unei 4,4'-diaminodiarilcetone la benzhidrol, urmată de condensarea acestuia cu o amină aromatică. Leucobaza rezultată se oxidează la carbinol, iar acesta în mediu acid formează colorantul corespunzător:



c) condensarea unei 4,4'-diaminodiarilcetone cu o amină aromatică conduce la un carbinol, iar acesta în mediu acid se transformă în colorant triarilmetinic:



Carbinol

d) condensarea unei aldehide aromatice (1 mol) cu amină aromatică sau cu fenol (2 moli) în mediu acid, urmată de oxidarea leucoderivatului rezultat la carbinol şi care apoi în mediu acid se transformă în colorant triarilmetinic.



Leucobază

Carbinol

Colorant

e) condensarea unui feniltriclormetan (1 mol) cu o amină aromatică sau cu un fenol (2 moli) conduce direct la colorant triarilmetinic:



4.5.3.2. COLORANTI TRIARILMETINICI BAZICI (CATIONICI).

Derivă de la fucsonimină



şi pot să fie diaminotriarilmetinici şi triaminotriarilmetinici. Bazicitatea lor se datorează grupelor amino, iar culoarea se datoreşte ionului de amoniu, stabilizat prin rezonanţă, care se obţine în mediu acid.

Dintre coloranţii diaminotriarilmetinici cel mai simplu este Violetul lui Doebner, obţinut din feniltriclormetan şi anilină:



Violetul lui Doebner

Dacă se condensează benzaldehida cu N,N-dimetilanilină se obţine derivatul tetrametilat, cunoscut sub numele de Verdele Malachit:



Inlocuind N,N-dimetilanilina cu N,N-dietilanilină se obţine colorantul Verde Diamant. Atât Verdele Malachit cât şi Verdele Diamant vopsesc fibrele poliacrilonitrilice şi bumbacul pretratat cu tanin în nuanţe de verde strălucitor, dar fără rezistenţă la lumină. Se mai folosesc la colorarea hârtiei şi la fabricarea unor cerneluri poligrafice.

Din clasa coloranţilor triaminotriarilmetinici bazici cel mai vechi este fucsina. Ea este de fapt un amestec de parafucsină (pararozanilină) şi rozanilină.



Parafucsină



Rozanilină

Obţinerea rozanilinei se realizează prin condensarea anilinei în amestec cu o- şi p-toluidină în prezenţa unui agent oxidant (sare ferică sau nitrobenzen). In primă fază are loc oxidarea para-toluidinei:



In continuare amestecul rezultat reacţionează cu anilina şi cu orto-toluidina:



Evident dacă se foloseşte doar anilină şi para-toluidină se obţine pararozanilina.

Prin condensarea anilinei cu orto-toluidină s-a obţinut aşa numita Fucsina nouă, cu trei grupe metil în moleculă.

Fucsina, de culoare roşie-albastră, nu se foloseşte la vopsirea materialelor textile, deoarece culorile rezultate au o slabă rezistenţă la lumină, dar se foloseşte la colorarea hârtiei precum şi la colorarea unor preparate anatomice în vederea analizării la microscop.

Parafucsina hexametilată la grupele amino din moleculă se numeşte Cristal Violet şi se obţine prin condensarea Cetonei lui Michler cu N,N-dimetilanilină în prezenţă de fosgen:



Bază carbinolică



Cristal Violet

Cristal Violetul se foloseşte la vopsirea hârtiei, la fabricarea creioanelor chimice, a hârtiei de copiat şi cernelurilor.

Se cunosc şi coloranţi triaminotriarilmetinici bazici arilaţi de azot. Prin arilarea succesivă a grupelor amino din fucsină rezultă produse de culoare albastră din ce în ce mai intensă. Astfel derivatul monofenilat este roşu-albastru, cel difenilat violet-albastru, iar cel trifenilat albastru.

Cel mai important colorant de acest tip este Albastrul de anilină. El se obţine prin încălzirea carbinolului Pararozanilinei cu anilină în prezenţă de acid benzoic drept catalizator.



Albastrul de Anilină.

4.5.3.3. COLORANTI TRIARILMETINICI ACIZI.

Se deosebesc coloranţi acizi diaminotriarilmetinici, triaminotriarilmetinici şi hidroxitriarilmetinici.

Coloranţii diaminotriarilmetinici din această clasă conţin în moleculă două grupări sulfonice. O grupare sulfonică neutralizează sarcina pozitivă a cationului colorat, iar cealaltă grupă asigură solubilitatea în apă a colorantului. Un astfel de colorant este Albastrul Patent VF, care se foloseşte la vopsirea lânei:



El se poate obţine prin condensarea acidului benzaldehid-2,4-disulfonic cu N,N-dietilanilină, urmată de oxidarea în mediu apos şi transformarea produsului în sare de sodiu.

Dintre coloranţii triaminotriarilmetinici acizi, prezentăm colorantul numit Violet acid 10B:



Pentru obţinerea lui se porneşte de la N-benzil-N-etil-anilină care se disulfonează cu oleum şi apoi se condensează cu hidrolul lui Michler. Leucobaza formată se oxidează cu dioxid de plumb, iar carbinolul rezultat se acidulează spre a se obţine colorantul.

Benzaurina şi aurina sunt cei mai simpli reprezentanţi ai coloranţilor hidroxitriarilmetinici. Benzaurina se poate obţine prin condensarea benzaldehidei cu fenolul (raport molar 1:2) în acid sulfuric concentrat, urmată de oxidarea leucoderivatului şi transformarea în colorant a carbinolului rezultat prin oxidare:





Carbinol　　　　　　　　　　Benzaurină

Pentru obţinerea aurinei se încălzeşte un amestec de fenol şi acid oxalic în acid sulfuric concentrat şi apoi produsul rezultat se oxidează:



Aurină

Ambele produse sunt insolubile în apă, dar solubile în alcool şi acid acetic formând soluţii galbene. Deoarece virează în roşu atât cu acizii cât şi cu bazele, pot servi ca indicatori în chimia analitică. Aurina poate fi folosită la colorarea hârtiei.



Aurina

O serie de compuşi hidroxitriarilmetinici care conţin grupe carboxil în poziţiile orto faţă de grupele hidroxil din moleculă sunt utilizaţi drept coloranţi acizi cromatabili la vopsirea lânii, mătăsii naturale sau nylonului.

4.6.COLORANTI FENOLFTALEINICI.

Cel mai simplu şi cel mai important colorant din această clasă este fenolftaleina. Aceasta se obţine prin condensarea anhidridei ftalice (1 mol) cu fenol (2 moli) în acid sulfuric concentrat, sau în topitură de clorură de zinc anhidră:



Produsul rezultat este insolubil în apă, dar solubil în alcool. Prin tratarea soluţiei sale alcoolice cu soluţii apoase alcaline rezultă o soluţie roşie violacee (la pH=8,3) care însă se decolorează în mediu puternic alcalin (pH > 10,2)



Culoare roşie (pH=8,4) Produs incolor

Dintre cele 3 structuri de mai sus, doar structura chinoidă are un sistem extins de electroni π între donorul O^- şi acceptorul C=O. In consecinţă, doar dianionul este roşu în timp ce trianionul rezultat la pH > 10,2 şi structura lactamică rezultată la pH < 8,3 absorb în ultraviolet şi în consecinţă nu prezintă culoare. Datorită modificării culorii în funcţie de pH, fenolftaleina se foloseşte ca indicator de pH

în analiza volumetrică.

Dacă în loc de fenol se utilizeaza crezol,timol sau naftol,se obţin crezolftaleina, timolftaleina şi respectiv naftolftaleina, coloranţi folosiţi de asemenea ca indicatori acido-bazici.

4.7. COLORANTI ANTRACHINONICI.

De la antrachinonă derivă mai multe tipuri de coloranţi care diferă prin structură şi tehnica de aplicare pe fibră. Din punct de vedere aplicativ, coloranţii antrachinonici se împart în coloranţi cu mordant, de dispersie, de cadă, bazici şi reactivi.

Culoarea compuşilor din această clasă, adică absorbţia de radiaţii din domeniul vizibil, se datoreşte structurii chinoidice, dar şi sistemului policiclic condensat. La toţi compuşii de acest fel prin reducerea grupelor cetonice din sistemul chinoid culoarea dispare,iar produsul se numeşte leucoderivat. Prin oxidarea acestuia se reface colorantul iniţial.

Cel mai vechi şi cel mai simplu reprezentant din grupa coloranţilor antrachinonici cu mordant este alizarina (1,2-dihidroxiantrachinona). Ea a fost obţinută iniţial din rădăcina diverselor specii ale plantei Rubia (de exemplu Rubia tinctorum), numită şi roibă sau garanţă, în care se găseşte sub formă de glicozid.

In anul 1868 Graebe şi Liebermann au obţinut alizarină prin condensarea anhidridei ftalice cu pirocatechină (catechol):



Din cei doi izomeri, doar primul este identic cu colorantul natural. Celălalt nu poate forma complecşi cu Al^{+3} sau Cr^{+3} şi deci nu poate fi colorant de mordant.

Astăzi alizarina se fabrică prin tratarea la 190-200°C timp de 10 ore a sării de sodiu a acidului antrachinon-2-sulfonic cu soluţie concentrată de hidroxid de sodiu şi în prezenta unui agent oxidant ($NaClO_3$, $KClO_3$):



Antrachinon-2-sulfonat

Alizarina

Se observă că reacţia începe prin atacul nucleofil al anionului hidroxil în poziţia α , vecină cu gruparea sulfonică, poziţie în care densitatea de electroni este redusă din cauza celor două grupări (cetonică şi sulfonică) atrăgătoare de electroni. Reacţia este facilitată de agentul oxidant care oxidează structura para-difenolică (sub formă de sare) rezultată. Final şi gruparea sulfonică este substituită cu o grupare hidroxil şi rezultă alizarina sub formă de sare disodică (culoare violetă). Prin acidulare se obţine alizarina de culoare galbenă, foarte greu solubilă în apă.

Cu ioni ai metalelor trivalente alizarina formează complecşi insolubili, coloraţi, cunoscuţi sub numele de „lacuri" şi care se fixează pe fibrele textile.



Complexul alizarinei cu Al^{+3}

Cu mordant de aluminiu alizarina formează un complex roşu, cu mordant de crom complex roşu-brun, iar cu mordant de fier complexul rezultat este negru-violet

Prin sinteză au mai fost obţinuţi şi alţi coloranţi, derivaţi ai alizarinei. Astfel, prin condensarea anhidridei ftalice cu hidrochinona s-a obţinut chinizarina, iar prin oxidarea alizarinei s-a obţinut purpurina:



Chinizarina



Purpurina

O serie de polihidroxiantrachinone au fost obţinute prin tratarea alizarinei cu oleum cu un mare procent de trioxid de sulf şi eventual în prezenţă de acid boric (reacţia Bohn-Schmitt).

Se cunosc şi coloranţi antrachinonici de cadă. Unii dintre ei derivă chiar de la antrachinonă, iar alţii de la antronă. Din prima categorie face parte Roşul indantren, obţinut din 1,4-diaminoantrachinonă prin tratare cu clorura de benzoil:



Roşu Indantren

Introducerea grupelor amino pe nucleul antrachinonei este de mare importanţă industrială. Aceasta se poate face prin reacţia Ullmann, adică prin substituţia nucleofilă a unui atom de halogen, grefat pe nucleul antrachinonei, cu amoniac sau cu o amină alifatică, reacţie catalizată de cupru metalic, precum şi de ionul cupric sau cupros.

Tot din această categorie fac parte antrimidele, care sunt compuşi ce conţin în moleculă două resturi antrachinonice unite printr-o grupă -NH- în poziţiile α, α'; α, β' sau β, β'. Un astfel de colorant este compusul numit Indantren Corint RK.



El se obţine din 1-amino-5-benzoilaminoantrachinona prin condensare cu 2-clorantrachinonă.

Prin topirea 1- sau 2-aminoantrachinonei cu hidroxid de potasiu se obţine Indantrona, cunoscută şi sub numele de Albastrul Indantren RS:



Pentru utilizarea în vopsitorie, aceşti coloranţi de cadă se reduc cu ditionit de sodiu ($Na_2S_2O_4$) în mediu bazic. In acest fel se obţine sarea disodică a difenolului corespunzător care este solubilă în apă şi care prin forţe Van der Waals şi punţi de hidrogen se fixează pe materialele textile.

Dintre coloranţii antrachinonici de cadă derivaţi de la antronă amintim Violantrona (dibenzantrona). Pentru obţinerea sa se foloseşte antrachinonă şi glicerină. In prezenţă de acid sulfuric concentrat şi la încălzire, din glicerină se formează acroleină, iar aceasta reacţionează cu antrona obţinută la rândul ei din antrachinonă prin reducere:



Benzantrona

In continuare, prin topirea benzantronei cu hidroxid de potasiu şi acetat de sodiu se obţine dibenzantrona:



Dibenzantronă

Se cunosc şi coloranţi antrachinonici de dispersie. Ei sunt derivaţi de la 1-hidroxiantrachinonă, 1,4-dihidroxi-, 1-amino-2,4-dibromo-, 1,5-diamino-, 4-bromo-1-metilaminoantrachinonă, etc. Au fost obţinuţi iniţial pentru vopsirea fibrelor de acetat de celuloză, iar ulterior, odată cu apariţia fibrelor textile moderne au fost utilizaţi şi la vopsirea acestora. Un astfel de colorant este cel numit Roslin violet R, obţinut din 1-aminoantrachinonă în felul următor:



Coloranţii de acest tip sunt greu solubili în apă, iar în baia de vopsire se află sub forma unei dispersii stabile de particule foarte fine.

Importanţă practică prezintă şi coloranţii antrachinonici acizi, folosiţi la vopsirea lânei, mătăsii naturale şi fibrelor poliamidice. Prin sulfonarea alizarinei cu oleum ce conţine 20% SO_3 se obţine acidul 1,2-dihidroxiantrachinon-3-sulfonic, care sub formă de sare de sodiu este cunoscut sub numele de Roşu de alizarină S.



Acest colorant vopseşte lâna în baie slab acidă, iar după tratare cu sare de aluminiu formează o coloraţie roşie.

4.8. COLORANTI INDIGOIZI SI TIOINDIGOIZI.

Sunt coloranţi de cadă derivaţi de la indigo şi respectiv tioindigo. Indigoul este unul din cei mai vechi coloranţi naturali. Era cunoscut încă din antichitate în Egipt şi în India, iar în secolul al XVI-lea a fost introdus şi în Europa. Sub forma glicozidului formei enolice a indoxilului, numit indican, indigoul se găseşte în planta numită Indigofera tinctoria în India, Java sau în China, iar în concentraţie mai mică se găseşte şi în planta Isatis tinctoria ce se cultivă în Europa. Prin macerarea cu apă a acestor plante sfărâmate se produce hidroliza glicozidului, se pune în libertate indoxilul şi acesta prin oxidare la aer formează indigoul:



Indigoul se prezintă ca o pulbere de culoare albastră-închisă. In apă, alcool, eter şi benzen indigoul este practic insolubil. De asemenea, este aproape insolubil în soluţii acide diluate şi în soluţii alcaline diluate, dar se dizolvă în acid sulfuric concentrat. In solvenţi nepolari, soluţiile de indigo au culoarea roşie-violetă, iar în solvenţi polari culoarea este albastră. Diferitele culori se datoresc solvatocromiei şi asociaţiilor intermoleculare.

Temperatura de topire (390°C) foarte ridicată şi solubilitatea foarte slabă a indigoului se explică prin aceea că în stare solidă fiecare moleculă de indigo este legată prin punţi de hidrogen de alte patru molecule.

Indigoul are caracter amfoter. Astfel cu HCl concentrat formează un clorderivat, iar cu NaOH formează o combinaţie sodată.

Datorită legăturii olefinice dintre cele două nuclee indolice, pentru indigo se pot prevedea doi izomeri geometrici:



Configurație „Z"



„E"

In stare solidă și în soluție indigoul adoptă configurația E, stabilizată prin legăturile de hidrogen intramoleculare dintre grupele >C=O și >NH.

Pentru vopsire, indigoul este redus în prealabil cu ditionit de sodiu în mediu bazic, proces în care se obține sarea de sodiu a leucoderivatului. Acesta se fixează pe fibre celulozice și poliamidice, iar prin expunere la aer se obține din nou colorantul.



Leucoindigo
(sare de sodiu)

Dintre coloranții derivați de la indigo prezintă interes 6,6'-dibromindigoul. El este identic cu Purpura regală (antică), colorant cunoscut din antichitate, izolat dintr-o moluscă numită Murex Brandaris și folosit la vopsirea robelor marilor preoți.

Prin sulfonarea indigoului se obține acidul indigo-5,5'-disulfonic, cunoscut sub numele de Indigo carmin. El are aceeași culoare ca indigoul, dar are avantajul că este solubil în apă.

Coloranții tioindigoizi au o mare varietate de culori, de la oranj la negru. Reprezentantul de bază este tioindigoul. El se poate obține din acid antranilic prin diazotare, tratarea sării de diazoniu cu sulfură de sodiu și reducerea sulfurii rezultate. Se obține în acest fel acidul tiosalicilic:



Acid tiosalicilic

In continuare, acidul tiosalicilic se condensează cu acid cloracetic, are loc ciclizarea în mediu bazic, decarboxilarea şi apoi oxidarea tioindoxilului:



Se cunosc numeroşi derivaţi ai tioindigoului ca de ex. 6,6'-diclorotioindigoul (Roşu de cadă 47), 5,5'-dicloro-7,7'-dimetiltioindigoul (Violet de cadă 2), iar prin condensarea tioindoxilului cu isatina se obţine colorantul numit Ecarlatul de tioindigo.



Prin condensarea tioindoxilului cu 4-nitrozo-N,N-dimetilanilina se obţine un alt colorant tioindigoid nesimetric.



4.9. COLORANTI AZINICI

4.9.1. GENERALITATI

Au formula generală:



Dacă X=NH ei se numesc diazinici, dacă X=O se numesc oxazinici, iar dacă X=S, tiazinici. Toţi coloranţii de acest tip au în poziţiile 3 şi 7 grupări amino, alchilamino, dialchilamino sau hidroxil ca auxocromi. Ei sunt coloranţi bazici şi vopsesc fibrele proteice şi bumbacul (după mordansarea acestuia cu tanin sau cu tartrat dublu de potasiu şi stibiu).

4.9.2. COLORANTI DIAZINICI

Sunt derivaţi ai fenazinei.



Fenazină 10-Fenilfenaziniu

Din această clasă prezintă importanţă safraninele. Ele derivă de la sărurile de 10-fenilfenaziniu.

Cea mai simplă safranină, numită fenosafranină, se obţine din p-fenilendiamină în felul următor:





Indamină

In continuare, indamina reacţionează cu anilina (adiţie 1,4) iar produsul rezultat trece în fenosafranină prin oxidare:





Fenosafranină
(Cation)

Sarcina pozitivă poate fi localizată şi la atomul de azot de care este legat radicalul fenil, astfel că cele trei structuri de rezonanţă care se pot scrie produc închiderea culorii (deplasarea absorbţiei maxime spre roşu).

La această clasă de coloranţi aparţine primul colorant de anilină, sintetic, numit **Mauveina lui Perkin.**



Mauveina lui Perkin.

El a fost obţinut în anul 1856 din anilină brută prin oxidare. Colorantul numit Negru de anilină s-a obţinut ulterior prin oxidarea anilinei cu dicromat de sodiu în mediu de acid clorhidric şi în prezenţă de sulfat de cupru drept catalizator Ai are o structură asemănătoare, dar polimerică:



Negru de anilină

Negrul de anilină este un colorant de developare care se obţine prin oxidarea directă a anilinei pe fibra de bumbac în baie acidă.

4.9.3. COLORANTI OXAZINICI

Sunt derivaţi de la fenoxazină, care prin oxidare în mediu acid trece într-o sare de fenoxaziniu colorată.



Ion de fenoxaziniu

Coloranţii conţin în poziţiile para faţă de atomul de azot grupe auxocrome.

Primul colorant din această clasă este Albastrul lui Meldola, obţinut în 1879. Acesta se poate obţine prin condensarea clorhidratului p-nitrozo-N,N-dimetilanilinei cu - naftolul în prezenţă de clorură de zinc:



Albastrul lui Meldola

Oxidarea se face pe seama excesului de clorhidrat al p-nitrozo-N,N-dimetilanilinei (scris mai sus sub forma tautomeră de izonitrozo), care prin reducere trece în p-amino-N,N-dimetilanilină.

Metoda aceasta a fost aplicată şi la obţinerea altor coloranţi oxazinici. Astfel prin condensarea acidului galic cu clorhidratul p-nitrozo-N,N-dimetilanilinei se obţine galocianina, al cărui ester metilic este un colorant violet:



Galocianina

Derivaţii galocianinei se utilizează sub formă de coloranţi cu mordant de crom, atât pentru lână cât şi pentru bumbac.

4.9.4. COLORANȚI TIAZINICI

Sunt derivați ai fenotiazinei, care prin oxidare în mediu acid trece într-o sare colorată de fenotiaziniu:



Ion de fenotiaziniu

Primul colorant din această clasă este Violetul lui Lauth, obținut în anul 1876 din p-fenilendiamină, hidrogen sulfurat și clorură ferică.

Cel mai important colorant din această clasă este Albastrul-metilen. El se obține din p-amino-N,N-dimetilanilină prin următoarele etape:



Verdele lui Bindschedler

Acest intermediar adiționează H_2S în pozițiile 1,4 și apoi se oxidează:





Albastrul-metilen

Oxidarea se face cu dicromat în mediu acid, iar în loc de hidrogen sulfurat se poate folosi acid tiosulfuric obţinut din tiosulfat de sodiu şi sulfat de aluminiu. Se introduce în acest fel gruparea $-S-SO_3H$ şi care prin tratare cu acid sulfuric se transformă în gruparea -SH.

Albastrul-metilen vopseşte lâna şi bumbacul (după mordansare cu tanin). In medicină se utilizează ca dezinfectant extern şi la colorarea anumitor germeni patogeni în tehnica bacteriologică.

4.10. COLORANTI CHINON-IMINICI

Au formula generală.

Sunt derivaţi de la p-chinoniminā (X=O, R=H) sau p-chinondiiminā (X=NH, R=H). La rândul lor p-chinonimina se obţine din p-aminofenol, iar p-chinondiimina din p-fenilendiaminā prin oxidare cu Ag_2O.



p-chinoniminā



p-Chinondiiminä

Ambele imine sunt extrem de instabile şi se stabilizează prin înlocuirea atomilor de hidrogen de la azot cu radicali fenil. Aceste substanţe prezintă absorbţie în vizibil, iar dacă în molecula lor se introduc grupări auxocrome devin coloranţi.

Din coloranţii de acest tip fac parte indaminele, indanilinele şi indofenolii:



Indamină
(Albastru fenilen)



Indanilină



Indofenol

Indofenolii şi indaminele se prepară prin oxidarea amestecului unui p-aminofenol sau unei p-fenilendiamine cu un fenol şi respectiv cu o amină aromatică. Oxidarea se face cu clorură ferică, dioxid de plumb sau cu dicromat de potasiu la rece. Astfel, prin oxidarea unui amestec de p-fenilendiamină şi anilină se obţine indamina,



Indamină

iar prin condensarea p-aminofenolului (oxidat) cu fenolul şi apoi oxidare se obţine indofenolul:



Indofenol

Dacă se condensează p-nitrozodimetilanilina cu α-naftolul în mediu acid se obţine Albastrul α-naftol:



Albastrul α-naftol

Indofenolii şi indaminele simple sau substituite sunt coloranţi albaştri, iar prin hidrogenare trec în leucoderivaţi incolori. Leucoderivaţii se oxidează uşor în prezenţa alcaliilor chiar cu oxigenul din aer, regenerând colorantul. Din cauza instabilităţii faţă de acizi, valoarea practică a indofenolilor şi indaminelor în vopsitoria textilă este mică. In schimb, unii dintre ei servesc ca materie primă la fabricarea safraninelor şi a coloranţilor de sulf.

Indanilinele se obţin din indamine prin hidroliză în mediu alcalin.

4.11. COLORANTII DE SULF.

Se pot obţine prin topirea cu sulf sau prin fierberea cu polisulfură de sodiu a unor amino- şi nitroderivaţi aromatici, nitro- şi nitrozofenoli, indofenoli, indoaniline, etc.

Sunt produşi insolubili în apă, iar pentru a vopsi se reduc cu sulfură de sodiu, transformându-se în leucoderivaţi, ale căror săruri sunt solubile şi se pot fixa pe materialul textil. Ulterior, prin oxidare la aer se reface colorantul.

Nu s-a putut determina structura tuturor coloranţilor de sulf, deoarece în marea lor majoritate sunt amestecuri. In procesul de sulfurizare mai sus amintit, sulful intră în structura colorantului sub formă de cicluri tiazolice, tiazinice, tiantrenice, precum şi în catene laterale



Tiantren

sub forma unor grupări mercapto, sulfurice sau polisulfurice.

Toţi coloranţii de sulf conţin punţi formate din doi sau mai mulţi atomi de sulf, între diferitele părţi ale moleculei. Prin reducerea lor cu sulfură de sodiu se obţin tiofenolaţi, ale căror săruri de sodiu sunt solubile în apă:

$$4\ Ar{-}S{-}S{-}Ar + 2\ Na_2S + 6\ NaOH \longrightarrow 8\ Ar{-}SNa + Na_2S_2O_3 + 3\ H_2O$$

Colorant de sulf   Tiofenolat

La oxidare, sărurile de sodiu ale tiofenolilor refac colorantul de sulf:

$$2\ Ar{-}SNa + H_2O + 1/2\ O_2 \longrightarrow Ar{-}S{-}S{-}Ar + 2\ NaOH$$

Coloranţii de sulf pot fi albaştri, verzi, galbeni, portocalii, maronii, bruni sau chiar negri. Cei de culoare albastră sau verde se pot obţine din indofenoli sau indaniline prin următoarele reacţii:





In această secvenţă, reacţiile a şi c sunt adiţii 1,4 la chinone, iar reacţiile b, d şi e sunt oxidări ($X = OH, NH_2, NR_2$).

Din clasa coloranţilor de sulf fac parte şi primulinele.

Primulina propriu-zisă se obţine prin sulfurarea p-toluidinei:



In continuare amino-tiofenolul rezultat se amestecă cu p-toluidină şi se oxidează cu sulf:



Dehidro-tioparatoluidină

Procesul se repetă, astfel că în etapa următoare se obţine aşa-numita „ baza primulinică ":



Baza primulinică

Primulina, colorantul propriu-zis, este galben şi se obţine prin sulfonarea bazei primulinice (în poziţia marcată *). Prin diazotare şi cuplare primulina se poate transforma în coloranţi de developare, mai rezistenţi.

4.12. COLORANTI POLIMETINICI, CIANINICI SI AZACIANINICI.

Coloranţii polimetinici se caracterizează printr-un lanţ de duble legături conjugate de tipul:

$$A = CH \left(CH = CH \right)_n D$$, unde n=0 sau întreg.

La capetele sistemului de duble legături conjugate se află un donor (D), respectiv acceptor (A).

Din clasa coloranţilor polimetinici fac parte coloranţii cianinici cu formula generală următoare:



După cum se poate deduce, atomii de azot fac parte dintr-un heterociclu. In acest caz, colorantul respectiv este o cianină. (Heterociclul este de obicei chinolină). Dacă doar unul din atomii de azot face parte dintr-un heterociclu, atunci colorantul este o hemicianină, iar dacă nici unul din atomii de azot nu face parte dintr-un heterociclu, colorantul este o streptocianină.

S-a constatat că alungirea catenei acestor coloranţi produce o deplasare batocromă a absorbţiei maxime şi anume cu cca 1000 A° (100 nm) pentru fiecare unitate -CH=CH-, iar în acelaşi timp creşte şi intensitatea absorbţiei.

Dezvoltarea clasei de coloranţi cianinici este strâns legată de perfecţionarea fotografiei în culori. Emulsia fotografică de bromură de argint în gelatină este sensibilă în

regiunea vizibilă a spectrului numai la lumina violetă sau albastră. Din această cauză obiectele de culoare roşie apar în fotografie negre, iar cele colorate în albastru-deschis apar albe. Adăugarea de anumiţi coloranţi în emulsia fotografică o sensibilizează pentru lungimi de undă mai mari, ceea ce face ca tonurile luminoase să apară în fotografie cu valori mai apropiate de cele percepute de ochiul omenesc. Unul din primii sensibilizatori de culoare folosit a fost Albastrul de cianină. El se obţine din iodetilat de lepidină şi iodetilat de chinolină în mediu bazic:



N-etil-4-chinolonă



Albastrul de cianină

Acest colorant sensibilizează placa fotografică pentru regiunea portocalie-roşie (580-610 nm) a spectrului.

Un colorant cu o structură asemănătoare, cu sensibilizare maximă între 520-570 nm este Roşu-etil. El se obţine printr-o reacţie similară cu aceea de mai sus, dar folosind iodetilat de chinaldină în loc de iodetilat de lepidină:



Roşu-etil

Cianinele în care una sau mai multe grupe metinice sunt înlocuite cu atomi de azot se numesc azacianine (numite şi coloranţi azametinici). Ei nu prezintă interes pentru fotografia în culori, ci sunt buni coloranţi cationici pentru

fibrele poliacrilonitrilice (melană).

4.13. COLORANTI FTALOCIANINICI.

Coloranţii ftalocianinici sunt de fapt pigmenţi organici şi au culoare albastră sau verde. Sunt caracterizaţi prin prezenţa în molecule a patru resturi de izoindol unite prin patru atomi de azot, rezultând un sistem conjugat continuu, plan şi netensionat compus din 16 atomi (8C şi 8N) derivat de la tetraazoporfirină.

Cel mai vechi colorant din această clasă este ftalocianina de cupru, preparată în 1927 de Diesbach şi Weid. Ca materie primă pentru obţinerea ftalocianinei nesubstituite se poate folosi anhidrida ftalică sau ftalodinitrilul, dar intermediarul cheie este 1,3-diiminoizoindolenina, care suferă apoi oligomerizare şi final prin reducere în mediu acid se obţine ftalocianina:



1,3-Diiminoizoindolenină



Dacă reacţiile anterioare decurg în prezenţă de clorură cuproasă se obţine ftalocianina de cupru cu randament bun, iar dacă se foloseşte clorură cuprică poate avea loc şi clorurarea în ciclurile benzenice. Pe scară mare ftalocianina de cupru se obţine încălzind la 200°C un amestec de anhidridă ftalică, uree, clorură cuprică şi molibdat de amoniu drept catalizator.

Se cunosc complecşi ai ftalocianinei cu Zn, Fe, Co, Ag, Cd, Ca şi chiar Na sau K. Aceşti complecşi sunt foarte rezistenţi în mediu acid şi practic insolubili în solvenţi organici.

Ftalocianina nesubstituită prezintă absorbţie maximă la 698 nm iar ftalocianina de cupru are un maxim la 678 nm. Dacă s-a transformat ftalocianina în dehidroftalocianină a rezultat un compus galben, puţin stabil. De aici rezultă importanţa aromaticităţii ftalocianinei, care având 18 electroni π într-un sistem conjugat continuu, respectă regula lui Hückel. Dehidroftalocianina are doar 16 electroni π în conjugare şi în consecinţă se modifică şi stabilitatea şi culoarea:



Unii complecşi ai ftalocianinei sunt folosiţi ca semiconductori, iar alţii au proprietatea de afixa oxigenul din aer (complexul cu Mn).

4.14. COLORANTI ACRIDINICI.

Sunt derivaţi de la acridină şi au în poziţiile para faţă de atomul de carbon din inelul central grupări auxocrome. Un astfel de colorant este Galbenul de acridină care se obţine din m-toluilendiamină prin condensare cu formaldehidă, ciclizare la încălzire cu acid clorhidric şi apoi oxidare:



Galben de acridină

Evident, structură chinoidă poate avea şi ciclul benzenic din stânga (în locul celui din dreapta), cele două structuri fiind mesomere (de rezonanţă).
Dacă în loc de m-toluilendiamină se foloseşte 3-N,N-dimetil-amino-anilină se obţine Oranj-acridina:



Importanţa coloranţilor de acest tip este în prezent redusă.

4.15. COLORANTI XANTENICI.

Sunt derivaţi de la xantenă şi au în poziţiile para faţă de atomul de carbon din inelul central grupări auxocrome.



Xantenă

Din această clasă fac parte rodaminele. Ele se obţin prin condensarea m-dialchilaminofenolilor cu formaldehidă în mediu acid şi oxidarea produsului rezultat:



Rodamină

Dacă în loc de formaldehidă se foloseşte benzaldehidă se obţine colorantul triarilmetinic corespunzător.

Se pot considera ca făcând parte din această clasă şi fluoresceina şi derivaţii săi, deşi ei sunt înrudiţi şi cu fenolftaleina. Fluoresceina se obţine prin condensarea rezorcinolului cu anhidridă ftalică:



In mediu bazic fluoresceina are o frumoasă fluorescență verde și se folosește la determinarea cursurilor subterane ale unor pârâuri.

Prin bromurarea fluoresceinei în toate cele patru poziții orto față de grupele hidroxil se obține eozina G, care este de asemenea fluorescentă. Se întrebuințează la prepararea de cerneală roșie și în microbiologie. Derivatul corespunzător care conține iod în loc de brom se numește Eritrozină B. Se întrebuințează în vopsitorie dar și ca stabilizator în tehnica fotografică.

4.16. COLORANTI REACTIVI.

Posedă în molecule anumite grupări reactive care se pot lega covalent cu grupele -OH din fibrele celulozice, cu grupele $-NH_2$ din fibrele proteice sau cu grupele -NH- din fibrele poliamidice. Majoritatea lor conțin în moleculă și grupări sulfonice care sub formă de săruri de sodiu le conferă solubilitate în apă. Datorită legării colorantului de fibră prin legături covalente, acești coloranți au o deosebită rezistență la spălare.

Din punctul de vedere al structurii chimice, coloranții reactivi pot să aparțină oricărei clase de coloranți, însă produsele comerciale curente sunt azoice sau antrachinonice.

In principiu, molecula unui colorant reactiv este constituită după următoarea schemă:

NaO_3S-Col-L-R

unde Col- reprezintă partea colorată, L- grupa de legătură, iar R- grupa reactivă. Grupa de legătură poate fi $-SO_2-$, $-SO_2NH-$ sau -N-triazină .

In funcție de gruparea reactivă R, coloranții reactivi se împart în următoarele categorii:

a) coloranți care conțin în moleculă un rest heterociclic pe care sunt grefați atomi de halogen ce pot fi înlocuiți prin reacția cu suportul textil.

b) coloranți care conțin ca sistem reactiv în moleculă o dublă legătură olefinică puternic polarizată prin prezența unei grupe puternic atrăgătoare de electroni vecină.

c) coloranți epoxidici.

Cei mai mulți coloranți din prima categorie conțin un rest triazinic, sunt derivați ai clorurii de cianuril și au în moleculă un atom de clor substituibil, în cazul celor monoclortriazinici, sau doi în cazul celor diclortriazinici.



Colorant diclortriazinic



monoclortriazinic

Un colorant diclortriazinic se poate obține punând în contact la temperaturi joase (0-5°C) cantități echimoleculare de aminocolorant (azoic sau antrachinonic) solubil în apă și clorură de cianuril. Pentru a neutraliza acidul rezultat, reacția are loc în mediu bazic. Dacă se dorește obținerea unui colorant monoclortriazinic, atunci colorantul diclortriazinic se tratează cu amoniac sau cu o amină:



Fixarea pe fibră a unui colorant triazinic se face prin reacție de substituție nucleofilă:

Col-X + MY- suport ⟶ Col-Y- suport + MX

unde X=Cl, Br iar Y=O, dacă suportul textil este celuloză, Y=NH în cazul suportului poliamidic și Y=NH, O, S, dacă suportul este de natură proteică. De asemenea M=Na, în cazul

celulozei şi M=H în cazul celorlalte fibre textile.

Coloranţii din categoria b, pot conţine ca sistem reactiv o dublă legătură vinil-sulfonică ($-SO_2CH=CH_2$) sau acrilamidică ($-NH-COCH=CH_2$). De fapt, aceste unităţi structurale reactive apar în timpul vopsirii sub acţiunea hidroxizilor alcalini. Colorantul reactiv vinil-sulfonic conţine în moleculă una sau mai multe grupe sulfatoetilsulfonice ca săruri de sodiu ($-SO_2-CH_2-CH_2-OSO_3Na$) şi care în mediu bazic formează gruparea vinilsulfonică:

$$Col-SO_2-CH_2-CH_2-OSO_3Na + NaOH \longrightarrow Col-SO_2-CH=CH_2 + Na_2SO_4 + H_2O$$

La această dublă legătură vinil-sulfonică se adiţionează nucleofil fibrele textile celulozice ($Cel-O^-$), proteice ($L-NH_2$) sau poliamidice ($-CH_2-CO-NH-$):

$$Col-SO_2-CH=CH_2 + Cel-O^- \longrightarrow Col-SO_2-\overset{-}{\ddot{C}}H-CH_2-O-Cel$$

$$\xrightarrow[- HO^-]{+ H_2O} Cel-SO_2-CH_2-CH_2-O-Cel$$

$$Col-SO_2 \longleftarrow CH=CH_2 + L-NH_2 \longrightarrow Col-SO_2-\overset{-}{\ddot{C}}H-CH_2-\overset{+}{N}H_2-L \longrightarrow$$

$$Col-SO_2-CH_2-CH_2-NH-L$$

$$Col-SO_2 \longleftarrow CH=CH_2 + HN\begin{matrix}CO-\\CH_2-\end{matrix} \longrightarrow Col-SO_2-\overset{-}{\ddot{C}}H-CH_2-\underset{H}{\overset{+}{N}}\begin{matrix}CO-\\CH_2-\end{matrix}$$

$$\longrightarrow Col-SO_2-CH_2-CH_2-N\begin{matrix}CO-\\CH_2-\end{matrix}$$

Coloranţii reactivi acrilamidici conţin în moleculă una sau mai multe grupe sulfatoetil-carbonilamidice ca săruri de sodiu ($-NH-CO-CH_2-CH_2-OSO_3Na$), care în timpul vopsirii în mediu alcalin, formează grupe acrilamidice şi la care se adiţionează nucleofil suportul textil:

$$Col-NH-CO-CH_2-CH_2-OSO_3Na + NaOH \longrightarrow Col-NH-CO-CH{=}CH_2 + Na_2SO_4 + H_2O$$

Fixarea colorantului pe fibră se face astfel:

$$Col-NH-CO-CH{=}CH_2 + Cel-O^- \longrightarrow Col-NH-CO-\bar{\ddot{C}}H-CH_2-O-Cel \xrightarrow[-\ HO^-]{+\ H_2O} Col-NH-CO-CH_2-CH_2-O-Cel$$

$$Col-NH-CO-CH{=}CH_2 + L-NH_2 \longrightarrow Col-NH-CO-\bar{\ddot{C}}H-CH_2-\overset{+}{N}H_2-L \longrightarrow Col-NH-CO-CH_2-CH_2-NH-L$$

$$Col-NH-CO-CH{=}CH_2 + HN{<}^{CO-}_{CH_2-} \longrightarrow Col-\underset{H}{N}-CO-\bar{\ddot{C}}H-CH_2-\underset{H}{\overset{+}{N}}{<}^{CO-}_{CH_2-} \longrightarrow Col-\underset{H}{N}-CO-CH_2-CH_2-N{<}^{CO-}_{CH_2-}$$

Coloranţii reactivi epoxidici (categoria **e**) se pot obţine după următoarea schemă de reacţie:



Colorant epoxidic

Coloranţii de acest tip se folosesc în special la vopsitul fibrelor poliamidice:



Coloranţii diclortriazinici sunt cunoscuţi sub denumirea comercială de Procian, iar cei monoclortriazinici sub denumirea de Procion H sau Cibacron. Din prima categorie

face parte colorantul Roşu reactiv B5A:



utilizat la vopsirea fibrelor celulozice, iar din a doua categorie colorantul Galben Procinyl G5:



utilizat la vopsirea fibrelor poliamidice.

C U P R I N S

Pag.

B I B L I O G R A F I E

1. C.D Neniţescu, „Chimie organică " , Vol. II, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1974.
2. M. Avram, „Chimie organică", Vol.II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1983.
3. J.B.Hendrickson, D.J.Cram şi G.S.Hammond, „Chimie organică", Editura didactică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976.
4. A.N.Nesmeyanov şi N.A.Nesmeyanov, „ Fundamentals of Organic Chemistry ", Vol.IV, Mir Publischers, Moscova, 1981.
5. E.Breitmaier şi G.Jung, „ Organische Chemie II ", Georg Thieme Verlag, Stuttgart - New York, 1983.
6. T.L. Gilchrist „ Heterocyclic Chemistry ", Longman Scientific and Technical, 1989.
7. H.Zollinger, „ Color Chemistry ", Weinheim - New York, V C H, 1987.
8. O.Maior, „ Compuşi naturali şi de semisinteză ", Univ. Bucureşti, 1974.